

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Chlorhexamed Gel 1%

Haleon Schweiz AG

Qu'est-ce que Chlorhexamed Gel et quand doit-il être utilisé?

Chlorhexamed Gel est indiqué pour le traitement et la prévention des inflammations bactériennes et mycosiques de la muqueuse buccale, des gencives, du parodonte et en cas d'aphtes.

Chlorhexamed Gel réduit efficacement le taux de germes dans la cavité buccale. Il en résulte une meilleure hygiène buccale et une réduction de la formation de la plaque dentaire bactérienne.

Quand Chlorhexamed Gel ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'hypersensibilité au principe actif, le digluconate de chlorhexidine, ou à l'un des excipients (voir «*Que contient Chlorhexamed Gel?*»).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Chlorhexamed Gel?

Chlorhexamed Gel est destiné uniquement à un usage buccal et ne doit pas être avalé.

Ne pas mettre en contact avec les yeux ou le conduit auditif. Dans le cas d'un contact accidentel avec les yeux, la zone proche des yeux ou le conduit auditif, il faut rincer abondamment à l'eau.

En l'absence d'amélioration après 1 semaine, il convient de consulter un médecin. Une utilisation prolongée de plus de 2 semaines ne doit se faire que sur avis du médecin ou du dentiste. La prudence est de rigueur en présence d'une inflammation du parodonte.

Si des douleurs, gonflements ou irritations de la cavité buccale apparaissent, vous devez immédiatement interrompre l'utilisation de Chlorhexamed Gel et consulter un médecin.

Arrêtez l'utilisation de Chlorhexamed Gel et consultez immédiatement un médecin si les symptômes suivants se manifestent: éruption, gonflements des lèvres, de la langue, de la gorge ou du visage, irritations de la cavité buccale, difficultés respiratoires ou troubles circulatoires. Ces symptômes peuvent être un signe d'une réaction allergique grave. Toutefois, ces réactions sont rares.

Une altération du goût ainsi que des picotements ou des sensations de brûlure sur la langue peuvent apparaître au début du traitement par Chlorhexamed Gel. Ces symptômes disparaissent généralement lors de la poursuite du traitement. S'ils persistent, vous devez consulter un médecin.

En cas d'utilisation régulière, on peut observer une coloration des dents et de la langue, réversible dans la plupart des cas. Vous pouvez prévenir ces colorations en réduisant la consommation d'aliments et boissons aux propriétés colorantes, p.ex. thé noir, café ou vin rouge. Le brossage des dents avec un dentifrice ordinaire permet normalement d'empêcher les colorations, mais un nettoyage professionnel des dents peut être nécessaire dans certains cas pour éliminer complètement les colorations. Pour l'entretien des prothèses dentaires, il est recommandé d'utiliser un produit de nettoyage spécifique.

L'efficacité de Chlorhexamed Gel est réduite par les substances anioniques (tensioactifs) généralement contenues dans les dentifrices usuels. Vous ne devez donc pas vous brosser les dents en même temps, mais au moins 5 minutes avant le traitement par Chlorhexamed Gel. Rincez-vous soigneusement la bouche à l'eau avant d'utiliser Chlorhexamed Gel (voir «*Comment utiliser Chlorhexamed Gel?*»).

Ne consommez aucun aliment ou aucune boisson contenant du sucre immédiatement après l'utilisation de Chlorhexamed Gel, car cela réduirait son efficacité.



L'hydroxystéarate de macrogolglycérol peut être irritant pour la peau.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Chlorhexamed Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Il est préférable, si possible, de renoncer aux médicaments pendant ou avant une grossesse.

Pendant la grossesse ou l'allaitement, vous ne devez utiliser Chlorhexamed Gel que sur l'avis de votre médecin.

Comment utiliser Chlorhexamed Gel?

Adultes et adolescents dès 12 ans:

Application locale: sauf prescription contraire du médecin, appliquer une petite quantité 1 à 2 fois par jour à l'aide d'un bâtonnet ouaté, directement sur la zone enflammée dans la cavité buccale.

Application à l'aide d'une brosse à dents: sauf prescription contraire du médecin, appliquer 1 à 2 fois par jour 2–3 cm de Chlorhexamed Gel sur une brosse à dents humide. Se brosser les dents et/ou la langue pendant 1 minute environ, minutieusement mais en douceur, puis recracher. Rincer avec un minimum d'eau (effet dépôt). L'ingestion accidentelle de Chlorhexamed Gel n'est pas dangereuse, mais peut entraîner des nausées.

Les dents doivent être brossées avec un dentifrice au moins 5 minutes *avant* l'utilisation de Chlorhexamed Gel. En outre, rincez-vous soigneusement la bouche à l'eau avant d'utiliser Chlorhexamed Gel.

Enfants

L'utilisation chez les enfants âgés de 6 à 12 ans ne doit se faire que sur instruction du dentiste. À ce jour, l'utilisation et la sécurité d'emploi chez l'enfant de moins de 6 ans n'a pas fait l'objet d'études. En raison du risque d'ingestion accidentel, l'utilisation n'est pas recommandée dans ce groupe d'âge.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Quels effets secondaires Chlorhexamed Gel peut-il provoquer?

Très fréquent (concerne plus d'une personne sur 10): dépôt sur la langue.

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100): bouche sèche, au début du traitement une altération transitoire du goût, un picotement, des sensations de brûlure ou une sensation de langue engourdie. Ces symptômes s'améliorent dans la plupart des cas avec la poursuite du traitement. Une consultation médicale est nécessaire si ces symptômes persistent.

Très rare (concerne moins d'une personne sur 10'000): réactions d'hypersensibilité (gencives rougies et douloureuses, réactions allergiques de la peau, des muqueuses et du système respiratoire), réactions allergiques graves après l'utilisation locale de chlorhexidine (voir «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Chlorhexamed Gel?»), desquamations réversibles de la muqueuse buccale ainsi que tuméfactions réversibles des glandes salivaires, colorations passagères des dents, des matériaux d'obturation dentaire, des prothèses dentaires et des papilles de la langue.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité



Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

À utiliser pendant 1 mois après ouverture.

Instructions de stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de la portée des enfants.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, drogueries, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Chlorhexamed Gel?

Principe actif

1 g de Chlorhexamed Gel 1%, Gel buccal contient 10 mg de digluconate de chlorhexidine.

Excipients

Alcool isopropylique, hydroxypropylcellulose, hydroxystéarate de macrogolglycérol, acétate de sodium trihydraté, huile essentielle de menthe poivrée, menthol, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

58026 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Chlorhexamed Gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube de 50 g.

Titulaire de l'autorisation

Haleon Schweiz AG, Risch.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

