

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Chlorhexamed Gel 1%

Haleon Schweiz AG

Che cos'è Chlorhexamed Gel e quando si usa?

Chlorhexamed Gel è utilizzato per il trattamento e la prevenzione delle infiammazioni batteriche e micotiche della mucosa orale, delle gengive, della paradontale e delle afte.

Chlorhexamed Gel riduce efficacemente la quantità di germi presenti nel cavo orale, migliorando l'igiene orale e riducendo la formazione della patina dentaria batterica (placca).

Quando non si può usare Chlorhexamed Gel?

Chlorhexamed Gel non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità verso il principio attivo clorexidina digluconato o verso una altra dei sostanze ausiliarie (vedi «*Cosa contiene Chlorhexamed Gel?*»).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Chlorhexamed Gel?

Chlorhexamed Gel è destinato unicamente all'utilizzo per bocca e gola e non deve essere ingerito.

Non mettere in contatto con gli occhi o con il condotto uditivo. In caso di contatto accidentale con gli occhi, con il contorno occhi o con il condotto uditivo, sciacquare abbondantemente con acqua.

Se entro 1 settimana non dovesse verificarsi alcun miglioramento, occorre consultare un medico. Un utilizzo prolungato per più di 2 settimane dovrebbe avvenire unicamente con l'accordo del medico o del dentista. È richiesta prudenza in caso di presenza di periodontite.

Se compare dolore, gonfiore o irritazione del cavo orale, interrompere immediatamente l'uso di Chlorhexamed Gel e consultare un medico.

Interrompa l'uso di Chlorhexamed Gel e consulti immediatamente un medico se compaiono i seguenti sintomi: eruzioni, tumefazione delle labbra, della lingua, della gola o del viso, irritazioni del cavo orale, affanno o disturbi circolatori. Questi segni possono essere indicativi di una grave reazione allergica. Tuttavia, questo tipo di reazioni è raro.

All'inizio del trattamento con Chlorhexamed Gel può comparire compromissione del gusto e sensazione di formicolio o di bruciore sulla lingua. Questi sintomi regrediscono, di norma, con la prosecuzione del trattamento. Se i sintomi persistono, dovrebbe consultare un medico.

Con l'uso regolare può comparire una colorazione dei denti e della lingua, reversibile nella maggioranza dei casi. È possibile prevenire questa colorazione riducendo il consumo di alimenti o bevande coloranti, quali tè nero, caffè e vino rosso. La pulizia dei denti con un dentifricio di uso comune può evitare questa colorazione, ma in alcuni casi può essere necessario una pulizia professionale per eliminare completamente la colorazione. Per il mantenimento di protesi dentarie si consiglia di utilizzare detergenti speciali.

L'effetto di Chlorhexamed Gel viene compromesso dalle sostanze anioniche (tensioattivi), che di regola fanno parte della composizione dei normali dentifrici. Perciò, non pulisca i denti contemporaneamente, ma almeno 5 minuti prima al trattamento con Chlorhexamed Gel. Prima dell'uso di Chlorhexamed Gel, sciacquare a fondo la bocca con acqua (vedere «*Come usare Chlorhexamed Gel?*»).

Subito dopo l'uso di Chlorhexamed Gel, non assuma cibi o bevande contenenti zucchero, perché l'effetto di Chlorhexamed Gel potrebbe risultare compromesso.

Il macroglicerolo idrossistearato può causare irritazioni cutanee.



Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Si può usare Chlorhexamed Gel durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante o prima di una gravidanza dovrebbe nel limite del possibile evitare di utilizzare medicinali.

Durante la gravidanza e l'allattamento utilizzare Chlorhexamed Gel solo dopo aver consultato il suo medico.

Come usare Chlorhexamed Gel?

Adulti e adolescenti dai 12 anni:

Applicazione locale: salvo diversa prescrizione, applicare 1–2 volte al giorno una piccola quantità di gel sulla parte infiammata della bocca, servendosi di un bastoncino di cotone.

Utilizzo con lo spazzolino da denti: salvo diversa prescrizione, mettere 2–3 cm di Chlorhexamed Gel sullo spazzolino bagnato 1–2 volte al giorno. Spazzolare a fondo ma delicatamente i denti e/o la lingua per circa 1 minuto e sputare. Risciacquare il meno possibile con acqua (effetto deposito). L'ingestione accidentale di Chlorhexamed Gel non è dannosa, ma può provocare dei conati di vomito.

Pulire i denti con il dentifricio almeno 5 minuti *prima* dell'uso di Chlorhexamed Gel. Prima dell'uso di Chlorhexamed Gel, inoltre sciacquare a fondo la bocca con acqua.

Bambini

L'impiego nei bambini tra i 6 e i 12 anni deve avvenire soltanto dietro indicazione del dentista. L'utilizzo e la sicurezza per i bambini di età inferiore ai 6 anni non sono ancora stati esaminati. A causa del rischio di involontaria ingestione si sconsiglia l'utilizzo del prodotto in questa fascia di età.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Chlorhexamed Gel?

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10): lingua patinata.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100): secchezza della bocca, all'inizio del trattamento compromissione transitoria del senso del gusto, formicolio, sensazione di bruciore o d'intorpidimento della lingua. Questi sintomi, nella maggior parte dei casi, migliorano nel corso del trattamento. Se questi sintomi persistono, consultare il medico.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000): reazioni di ipersensibilità (gengive arrossate e dolenti, reazioni allergiche della cute, delle mucose e del sistema respiratorio), reazioni allergiche gravi in seguito all'applicazione locale di clorexidina (vedere «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Chlorhexamed Gel?»), alterazioni desquamative transitorie della mucosa orale e tumefazione transitoria delle ghiandole salivari, colorazioni transitorie di denti, otturazioni dentarie, protesi dentarie e papille linguali.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con EXP sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Utilizzabile per 1 mese dopo l'apertura.



Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene Chlorhexamed Gel?

Principio attivo

1 g di Chlorhexamed Gel 1%, Gel per mucosa orale contiene 10 mg di clorexidina digluconato.

Sostanze ausiliarie

Alcool isopropilico, idrossipropilcellulosa, macrogolglicerolo idrossistearato, acetato di sodio triidrato, olio di menta piperita, mentolo, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

58026 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Chlorhexamed Gel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubetto da 50 g.

Titolare dell'omologazione

Haleon Schweiz AG, Risch.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

