

Was ist Gly-Coramin und wann wird es angewendet?

Gly-Coramin enthält Traubenzucker (Glucose), der Energie spendet, und Nikethamid, das die Atmung anregend beeinflussen kann. Gly-Coramin kann angewendet werden bei: Ermüdungserscheinungen bei körperlichen Anstrengungen sowie bei Beschwerden, die durch einen Höhengaufenthalt oder Luftdruckveränderungen wie z.B. beim Berggehen hervorgerufen werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Hinweis für Diabetiker: Gly-Coramin enthält Rohrzucker (Saccharose) und ist deshalb für Diabetiker nicht geeignet.

Hinweis für Sportler: Die Einnahme von Gly-Coramin kann eine positive Reaktion bei Antidoping-Kontrollen zur Folge haben.

1 Lutschtablette enthält 2,7 g Kohlenhydrate (= 0,27 Brotwerte).

Wann darf Gly-Coramin nicht eingenommen / angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber in Gly-Coramin enthaltenen Substanzen sowie bei Epilepsie, Porphyrrie (eine Stoffwechselerkrankung) und Bluthochdruck.

Wann ist bei der Einnahme / Anwendung von Gly-Coramin Vorsicht geboten?

Gly-Coramin enthält 200 mg Traubenzucker (Glucose) sowie 1,1 g Rohrzucker (Saccharose) und ist deshalb für Diabetiker nicht geeignet.

Bitte nehmen Sie Gly-Coramin erst nach Rücksprache mit ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin ein, wenn ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Kann schädlich für die Zähne sein.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden.

Darf Gly-Coramin während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen / angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind oder es werden möchten und während der Stillzeit sollten Sie Gly-Coramin nicht einnehmen. Schwangerschaftsbedingte Ermüdungserscheinungen sollen nicht mit Gly-Coramin behandelt werden.

Wie verwenden Sie Gly-Coramin?

Die Wirkung von Gly-Coramin wird rasch verspürt.

Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren: 1 Lutschtablette im Munde zergehen lassen. In der Regel können auf den Tag verteilt bis zu ca. 10 Lutschtabletten eingenommen werden. Gly-Coramin soll bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht angewendet werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Gly-Coramin haben?

Für Gly-Coramin sind bisher keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, sollten Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit



Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Entsorgungshinweis

Entsorgen Sie keine Arzneimittel in das Abwasser oder den Hausmüll. Geben Sie abgelaufene oder nicht mehr benötigte Arzneimittel aus Haushalten an einer Abgabestelle (z.B. Apotheke, Drogerie, Arztpraxis) oder an einer Sammelstelle zurück. Diese Massnahmen tragen zum Schutz der Umwelt bei.

Lagerungshinweis

Vor Feuchtigkeit schützen und bei Raumtemperatur (15–25 °C) lagern.

Arzneimittel sollen für Kinder unerreichbar aufbewahrt werden, Gly-Coramin insbesondere wegen der Verwechslungsgefahr mit Bonbons.

Weitere Hinweise

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in Gly-Coramin enthalten?

1 Lutschtablette enthält

Wirkstoffe

125 mg Nicethamid, 200 mg Glucose in Form von Glucose-Sirup

Hilfsstoffe

Saccharose; Pflanzenöl; Gelatine; getrocknetes arabisches Gummi, Lecithin; Glycerinmonostearat (E 471); Citronensäure-Monohydrat; natürliches Zitronenaroma (enthält Citral); Betacarotin (E 160 (iii)); Stärkenatriumoctenylsuccinat (E 1450); Tocopherole (E 306); gereinigtes Wasser.

Zulassungsnummer

25385 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Gly-Coramin? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packung zu 30 Lutschtabletten.

ZulassungsinhaberIn

Hänseler AG, CH-9100 Herisau

Diese Packungsbeilage wurde im März 2025 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

