

▼ Questo medicamento è soggetto a monitoraggio addizionale. Ciò consente una rapida identificazione delle nuove conoscenze in materia di sicurezza. Può contribuire segnalando gli effetti collaterali. Per le indicazioni sulla notifica degli effetti collaterali, cfr. la fine del capitolo «Quali effetti collaterali può avere WEZENLA?».

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

WEZENLA® soluzione iniettabile in siringa preriempita

Amgen Switzerland AG

Che cos'è WEZENLA e quando si usa?

WEZENLA contiene il principio attivo «ustekinumab», un anticorpo monoclonale umano. Gli anticorpi monoclonali sono proteine che riconoscono specifiche proteine presenti nel corpo e si legano ad esse. WEZENLA blocca l'azione di due proteine presenti nel suo corpo, chiamate interleuchina 12 (IL-12) e interleuchina 23 (IL-23). Queste proteine sono coinvolte nei processi infiammatori dell'organismo.

Su prescrizione del medico, WEZENLA viene utilizzato:

- per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età superiore ai 6 anni in cui altri medicamenti o la fototerapia non hanno prodotto una risposta, sono controindicati o non sono stati tollerati;
- da solo o insieme al medicamento metotrexato per il trattamento dell'artrite psoriasica negli adulti che non hanno risposto in maniera soddisfacente alle precedenti terapie;
- e per il trattamento del morbo di Crohn attivo da moderato a grave negli adulti in cui altri medicamenti non hanno prodotto o non producono più una risposta soddisfacente, sono controindicati o non sono stati tollerati.

Che cos'è la psoriasi a placche?

La psoriasi del tipo a placche è una malattia infiammatoria della pelle e delle unghie. WEZENLA viene utilizzato per alleviare i segni e i sintomi di infiammazione della sua malattia.

Che cos'è l'artrite psoriasica?

L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria delle articolazioni, in genere associata alla psoriasi. WEZENLA viene utilizzato per alleviare i segni e i sintomi della sua malattia e per migliorare la sua funzionalità fisica.

Che cosa sono il morbo di Crohn?

Il morbo di Crohn è una malattia infiammatoria intestinale. WEZENLA viene utilizzato per attenuare i segni e i sintomi della malattia.

Quando non si può usare WEZENLA?

WEZENLA non può essere utilizzato in caso di ipersensibilità (allergia) a ustekinumab o a uno degli altri componenti di WEZENLA. Un elenco completo dei principi attivi e delle sostanze ausiliarie di WEZENLA è riportato nel capitolo «Cosa contiene WEZENLA?».

WEZENLA non può essere utilizzato nemmeno se lei, o suo figlio, ha un'infezione grave come p.es. la tubercolosi (vedere «Quando è richiesta prudenza nell'uso di WEZENLA?»).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di WEZENLA?



Prima di ogni trattamento, informi il medico di tutte le malattie di cui soffre/di cui soffre suo figlio, comunicandogli tra l'altro:

- se lei/suo figlio ha un'infezione, anche molto lieve.
- se lei ha una ferita aperta.
- se lei/suo figlio ha ricevuto in passato un trattamento per la tubercolosi (TB) o è stato di recente a stretto contatto con qualcuno che potrebbe essere affetto da tubercolosi. Il medico visiterà e sottoporrà lei/suo figlio a un esame che permette di diagnosticare la tubercolosi.
- se lei/suo figlio è attualmente affetto da cancro o ha ricevuto in passato un trattamento per una malattia tumorale. WEZENLA appartiene a una classe di medicinali che indeboliscono l'attività del sistema immunitario (difese dell'organismo) e possono quindi aumentare il rischio di cancro.
- se lei/suo figlio si è vaccinato di recente o prevede di sottoporsi a una vaccinazione. Informi il suo medico anche se a casa sua qualcuno deve vaccinarsi. I virus presenti in alcuni vaccini possono contagiare le persone con un sistema immunitario indebolito e causare gravi problemi di salute.
- se lei/suo figlio riceve o si appresta a ricevere un trattamento con un immunosoppressore (un medicinale che inibisce l'azione del sistema immunitario) o una fototerapia (in cui il corpo viene irradiato con una speciale luce UV). WEZENLA influenza il sistema immunitario e la combinazione di queste forme di trattamento potrebbe aumentare il rischio di malattie che insorgono a causa di un indebolimento del sistema immunitario, sebbene la combinazione di queste forme di trattamento non sia ancora stata studiata.
- se lei/suo figlio riceve o ha ricevuto iniezioni per il trattamento di allergie, in particolare per reazioni allergiche gravi.

Se non è sicuro se una delle condizioni menzionate sopra la riguarda/riguarda suo figlio, parli con il medico o il farmacista prima di usare WEZENLA.

Chi soffre di psoriasi può essere a maggior rischio di infarto e ictus. Si rivolga immediatamente ad un medico se manifesta dolore al petto, debolezza e una sensazione anomala su un lato del corpo, flaccidità del volto o disturbi visivi o del linguaggio.

Durante il trattamento informi *immediatamente* il medico:

- se lei/suo figlio presenta infezioni persistenti che non guariscono o infiammazioni che continuano a riattivarsi. Consulti il medico anche se lei/suo figlio mostra segni di un'infezione, come febbre, affaticamento, tosse (persistente), fiato corto, sintomi simil-influenzali, una sensazione di bruciore quando urina o se lei/suo figlio presenta aree cutanee calde, arrossate o dolenti o ferite sul corpo. Questi possono essere segni di infezioni, come infezioni toraciche o infezioni cutanee o del fuoco di Sant'Antonio, che potrebbero causare gravi complicazioni. Consultare il suo medico è importante, perché WEZENLA può indebolire le difese immunitarie che combattono le infezioni, il che può portare a infezioni che colpiscono soprattutto le persone il cui sistema immunitario è indebolito (infezioni opportunistiche). Nei pazienti trattati con ustekinumab sono state segnalate infezioni opportunistiche del cervello (encefalite, meningite), dei polmoni e degli occhi. Alcune infiammazioni potrebbero peggiorare notevolmente e richiedere un trattamento in ospedale.
- se lei/suo figlio presenta piaghe o ferite aperte, nuove o che si modificano, sulla pelle colpita dalla psoriasi o su quella sana.
- se lei/suo figlio sviluppa un'eruzione cutanea rossa, in rilievo e squamosa, a volte con un bordo più scuro, in aree di cute esposte al sole o che si manifesta insieme a dolori articolari. Durante il trattamento con ustekinumab, in alcuni pazienti si sono verificate reazioni simili al lupus, inclusi lupus cutaneo e sindrome simil-lupoide.
- se lei/suo figlio mostra segni o sintomi di una reazione allergica, tra cui: difficoltà a respirare o a inghiottire, bassa pressione sanguigna che può causare vertigini o confusione, eruzioni cutanee, gonfiore del viso, delle labbra della bocca o della gola.
- se lei/suo figlio presenta mal di testa, convulsioni o disorientamento.



Alcuni tipi di vaccini (vaccini vivi) non devono essere somministrati durante il trattamento con WEZENLA. Se ha ricevuto WEZENLA durante la gravidanza, informi il medico del suo bambino del trattamento con WEZENLA prima che il bambino riceva qualsiasi vaccino, inclusi vaccini vivi come il vaccino BCG (per la prevenzione della tubercolosi), il vaccino per il rotavirus (per la prevenzione di malattie gastrointestinali causate da rotavirus) o altri vaccini vivi.

È opportuno evitare un'eccessiva esposizione al sole e utilizzare le normali misure di protezione solare, tra cui l'applicazione di una crema solare.

Finora non è noto se l'assunzione di WEZENLA comprometta la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine.

Informi il medico o il farmacista nel caso in cui lei/suo figlio soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può usare WEZENLA durante la gravidanza o l'allattamento?

Informi il suo medico prima del trattamento se è in corso una gravidanza o sta pianificando una gravidanza. Non è noto se WEZENLA possa compromettere la fertilità.

Se lei è una donna in età fertile, le sarà consigliato di evitare una gravidanza; dovrà utilizzare metodi contraccettivi affidabili durante l'uso di WEZENLA e per almeno 15 settimane dopo la fine del trattamento. Se è in corso una gravidanza, il suo medico stabilirà se il beneficio dell'uso di WEZENLA sia chiaramente superiore ai possibili rischi.

Ustekinumab può passare in quantità molto ridotte nel latte materno. Se sta allattando con latte materno o prevede di farlo, si rivolga al suo medico. Lei e il medico dovreste decidere insieme se deve interrompere l'assunzione di WEZENLA durante l'allattamento o continuare a utilizzare WEZENLA ed evitare di allattare.

Come usare WEZENLA?

Per il trattamento della psoriasi a placche e dell'artrite psoriasica, WEZENLA viene iniettato sotto la pelle («iniezione sottocutanea»).

Per il trattamento del morbo di Crohn, la prima dose di WEZENLA viene somministrata da personale specializzato per via endovenosa, le successive per via sottocutanea.

La somministrazione di WEZENLA dovrebbe avvenire sotto la guida e la supervisione del suo medico.

Tuttavia, il medico può stabilire che lei può iniettarsi da solo WEZENLA. In questo caso, le sarà spiegato come iniettare WEZENLA. In caso di domande sull'autoiniezione o di dubbi, si rivolga al suo medico. Quando si inietta da solo WEZENLA sotto la pelle, usi WEZENLA sempre esattamente secondo le istruzioni del suo medico. Troverà istruzioni dettagliate per l'iniezione alla fine di questo foglietto illustrativo.

Nei bambini e negli adolescenti, WEZENLA dovrebbe essere somministrato da un operatore sanitario.

Il suo medico deciderà quanto WEZENLA occorre utilizzare e per quanto tempo.

Se ha dei dubbi, chiedi al suo medico. Parli con il suo medico per sapere quando lei/suo figlio dovrà sottoporsi alle iniezioni e alle visite di controllo.

Psoriasi a placche (adulti, adolescenti e bambini a partire dai 6 anni con un peso corporeo superiore ai 60 kg)

Solitamente, la dose consigliata è di 45 mg come iniezione sottocutanea, seguita dall'iniezione di un'altra dose da 45 mg dopo 4 settimane, e poi ogni 12 settimane. Per i pazienti con un peso corporeo oltre i 100 kg, il medico deciderà se è necessario somministrare una dose maggiore.

Non si deve utilizzare la siringa preriempita nei bambini e negli adolescenti di peso inferiore ai 60 kg. Il medico prescriverà a suo figlio la dose di WEZENLA soluzione iniettabile in funzione del peso.

WEZENLA è sconsigliato nei bambini sotto i 6 anni di età perché il suo impiego in questo gruppo di pazienti finora non è stato esaminato.

Artrite psoriasica (adulti)



Solitamente, la dose consigliata è di 45 mg come iniezione sottocutanea, seguita dall'iniezione di un'altra dose da 45 mg dopo 4 settimane, e poi ogni 12 settimane. In caso di risposta insufficiente, il suo medico deciderà se è necessario aumentare la dose.

Morbo di Crohn (adulti)

La prima dose viene somministrata per via endovenosa. 8 settimane dopo la prima dose somministrata per via endovenosa, viene iniettata una dose da 90 mg per via sottocutanea. 12 settimane dopo, e poi ogni 12 settimane, viene somministrata un'altra dose da 90 mg. Il suo medico deciderà se è opportuno ridurre l'intervallo tra le iniezioni a 8 settimane.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Se ha usato una quantità di WEZENLA maggiore del dovuto (o iniettando una dose troppo alta o a causa di iniezioni troppo frequenti) consulti immediatamente il suo medico o il suo farmacista. Porti sempre con sé la confezione originale del medicamento, anche se è vuota.

Se ha dimenticato di iniettare WEZENLA, informi il suo medico o il suo farmacista. Non inietti una dose doppia se ha dimenticato l'iniezione precedente.

Quali effetti collaterali può avere WEZENLA?

Durante l'uso di WEZENLA possono insorgere i seguenti gravi effetti collaterali. Consulti *immediatamente* il medico se lei/suo figlio manifesta uno dei seguenti effetti collaterali:

- segni di una grave reazione allergica o di una reazione di ipersensibilità, quali difficoltà a respirare o a inghiottire, bassa pressione sanguigna, vertigini o confusione, gonfiore del viso, delle labbra, della bocca o della gola, problemi respiratori o di deglutizione, eruzione cutanea, orticaria, gonfiore delle mani, dei piedi o delle caviglie;
- segni di polmonite e reazione polmonare allergica, p. es. tosse, difficoltà respiratoria e febbre;
- segni di infezioni (inclusa la tubercolosi), per esempio, febbre, affaticamento, tosse (persistente), fiato corto, sintomi simil-influenzali, sudorazione notturna, perdita di peso, diarrea, piaghe, problemi ai denti, disturbi visivi o perdita della vista, mal di testa, rigidità del collo, sensibilità alla luce, nausea, confusione, sensazione di bruciore quando urina;
- desquamazione della pelle – aumento del rossore e desquamazione della pelle su una superficie corporea più ampia possono essere segni di una psoriasi eritrodermica o di una dermatite esfoliativa (eritrodermia), due gravi reazioni cutanee.

Effetti collaterali di altro tipo possono insorgere durante l'uso di WEZENLA:

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Infezione delle vie respiratorie superiori, infiammazione della gola, vertigini, mal di testa, dolore orofaringeo, sinusite, diarrea, nausea, vomito, prurito, mal di schiena, dolori muscolari, dolori alle articolazioni, spossatezza, arrossamento e dolore nel punto di iniezione.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Infiammazione dei denti, infiammazione del tessuto sottocutaneo che si manifesta a livello della pelle con calore eccessivo, fuoco di Sant'Antonio (herpes zoster), infezioni virali delle vie respiratorie superiori, infezioni delle vie respiratorie inferiori, micosi vulvo-vaginali, reazioni di ipersensibilità, depressione, naso chiuso, acne, alterazione della psoriasi con arrossamento e formazione di nuove, piccole vesciche gialle o bianche sulla cute, a volte associata a febbre (psoriasi pustolosa), desquamazione (esfoliazione) della pelle, reazioni nel punto di iniezione (tra cui sanguinamento, formazione di ematomi, indurimento, gonfiore e prurito), stanchezza, palpebra cadente e rilassamento muscolare ad un lato del viso (paralisi facciale o «paralisi di Bell»), che solitamente è temporanea.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)



Reazioni gravi, come reazioni allergiche, rapido gonfiore della pelle o delle mucose (angioedema), infiammazione allergica dei vasi sanguigni (vasculite da ipersensibilità), polmonite e reazione polmonare allergica, p. es. tosse, difficoltà respiratoria e febbre.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000).

Lupus cutaneo o sindrome simil-lupoide (eruzione cutanea rossa, in rilievo, squamosa in aree di cute esposte al sole, eventualmente con dolori articolari).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare in frigorifero (2-8 °C). Non congelare. Non agitare.

Conservare nella scatola originale per proteggere la soluzione dalla luce.

Se necessario, le singole siringhe preriempite di WEZENLA possono anche essere conservate a temperatura ambiente (fino a 30 °C), per un unico periodo di massimo 30 giorni, nell'imballaggio esterno al fine di proteggerle dalla luce. Registrare la data in cui la siringa preriempita viene rimossa per la prima volta dal frigorifero e la data in cui va eliminata. La data in cui va eliminata non deve superare la data di scadenza originale stampata sulla confezione. Una volta che una siringa è stata conservata a temperatura ambiente, non deve essere rimessa in frigorifero. Gettare la siringa se non utilizzata entro 30 giorni a temperatura ambiente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

La soluzione deve essere ispezionata visivamente per individuare l'eventuale presenza di materiale particolato o decolorazione prima della somministrazione sottocutanea. La soluzione è da chiara a opalescente, da incolore a giallo chiaro. Il medicinale non deve essere utilizzato se la soluzione è discromica od opaca, o se è presente del materiale particolato estraneo.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene WEZENLA?

Principi attivi

WEZENLA contiene come principio attivo ustekinumab.

Ogni siringa preriempita contiene 45 mg (45 mg in 0,5 ml) o 90 mg (90 mg in 1 ml) di ustekinumab.

La soluzione è da chiara a opalescente, da incolore a giallo chiaro.

Sostanze ausiliarie

WEZENLA contiene come sostanze ausiliarie: saccarosio, L-istidina, L-istidina cloridrato monoidrato, polisorbato 80 e acqua per preparazioni iniettabili.

Numero dell'omologazione

70188 (Swissmedic).

Dove è ottenibile WEZENLA? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia solo dietro presentazione della prescrizione medica.

WEZENLA soluzione iniettabile in siringa preriempita 45 mg/0,5 ml.



WEZENLA soluzione iniettabile in siringa preriempita 90 mg/1 ml.

Titolare dell'omologazione

Amgen Switzerland AG, Risch

Domicilio: 6343 Rotkreuz

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Version 23072025

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso

WEZENLA®

Ustekinumab


Soluzione iniettabile per uso sottocutaneo

Siringa preriempita monodose

Queste istruzioni per l'uso contengono informazioni per l'iniezione di WEZENLA mediante una siringa preriempita.

Il medicamento contenuto nella siringa preriempita di WEZENLA è destinato all'iniezione sotto la pelle (iniezione sottocutanea). Ulteriori informazioni su WEZENLA sono contenute nell'Informazione destinata ai pazienti di WEZENLA.


Introduzione alla siringa preriempita




1 Informazioni importanti da conoscere prima di iniettare WEZENLA

Dosaggio:

- WEZENLA è disponibile in due diverse dosi: 45 mg e 90 mg. Controlli la prescrizione medica per assicurarsi di avere la dose corretta.
- Se la dose è di 45 mg, riceverà una siringa preriempita da 45 mg.
- Se la dose è di 90 mg, riceverà una siringa preriempita da 90 mg o due siringhe preriempite da 45 mg.
 - Se riceve due siringhe preriempite da 45 mg, dovrà praticare due iniezioni direttamente una dopo l'altra.
- L'aspetto della siringa preriempita è diverso per le varie dosi. Anche la quantità di medicamento nella siringa è diversa per le varie dosi.
- La dose da 45 mg contiene una quantità minore di medicamento e la dose da 90 mg contiene una quantità maggiore di medicamento nella siringa. Le seguenti figure mostrano come appare la dose nella siringa.



45 mg/0,5 ml



90 mg/ml

Uso della siringa preriempita di WEZENLA:


- È importante che non provi a praticare l'iniezione prima di aver letto e compreso appieno queste istruzioni per l'uso.
- Se il medico decide che lei o la persona che la assiste potete iniettare WEZENLA a casa, dovete essere istruiti sul modo corretto di preparare e iniettare WEZENLA. **Non** cerchi di praticare l'iniezione di WEZENLA.



personalmente prima di essere stato istruito dal medico o dal personale medico specializzato sul metodo corretto di iniezione.

- I bambini di età pari o superiore a 12 anni con psoriasi e un peso corporeo di almeno 60 kg possono utilizzare una siringa preriempita sotto la supervisione di un genitore o di una persona che li assiste.
- **Non** utilizzi la siringa se la confezione esterna o il sigillo sono danneggiati.
- **Non** utilizzi la siringa se la data di scadenza stampata sull'etichetta è stata superata.
- **Non** agiti la siringa.
- **Non** rimuova il cappuccio di protezione dell'ago dalla siringa finché non è pronto a eseguire l'iniezione.
- **Non** utilizzi la siringa se è stata congelata.
- **Non** utilizzi la siringa se è caduta su una superficie dura. Alcune parti della siringa possono essersi danneggiate, anche in assenza di danni visibili. In questo caso, utilizzi una nuova siringa e contatti il medico o il personale medico specializzato.


Importante: tenga la siringa e il contenitore per lo smaltimento di oggetti appuntiti e taglienti fuori dalla portata dei bambini.

2	Preparazione dell'iniezione di WEZENLA
2a	Afferri la siringa preriempita in corrispondenza del corpo della siringa e la rimuova dalla confezione. Non tocchi mai le CLIP di PROTEZIONE DELL'AGO durante l'uso poiché ciò può causare l'attivazione prematura della protezione dell'ago.
	
• Non afferri la siringa dallo stantuffo della siringa, dal poggiaadita o dal cappuccio di protezione dell'ago.	
• Non afferri la siringa dalle clip di protezione dell'ago.	
• Non agiti mai la siringa preriempita.	
• Prelevi il numero di siringhe necessarie per l'iniezione.	
• Riponga le siringhe non utilizzate in frigorifero.	




2b	Attenda 30 minuti per consentire alla siringa preriempita di raggiungere la temperatura ambiente.
ATTENDERE 30 minuti	
• Lasci che la siringa si riscaldi da sola.	
• Non la riscaldi con acqua calda, nel microonde o alla luce diretta del sole.	
• Non agiti mai la siringa.	
• Se la siringa viene utilizzata a temperatura ambiente, l'iniezione risulterà più confortevole.	

2c	Prepari i seguenti oggetti necessari per l'iniezione e li posizioni su una superficie pulita, piana e ben illuminata.
----	---

 Contenitore per lo smaltimento di oggetti appuntiti e taglienti    Salvietta imbevuta di alcool Cerotto Batuffolo di cotone idrofilo o garza	
• Siringa preriempita di WEZENLA (temperatura ambiente)	
• Contenitore per lo smaltimento di oggetti appuntiti e taglienti (cfr. passaggio 5. Smaltimento di WEZENLA e controllo della sede di iniezione)	
• Salvietta imbevuta di alcool	
• Cerotto	
• Batuffolo di cotone idrofilo o garza	



3 Preparazione dell'iniezione




3a Controlli il medicamento attraverso la finestra di visualizzazione. La soluzione deve essere da limpida a incolore a leggermente gialla.

- È normale che possano essere visibili bolle d'aria.
- **Non** utilizzi WEZENLA se il medicamento è stato congelato, è torbido, ha cambiato colore o contiene particelle.

Importante: se il medicamento è torbido, ha cambiato colore o contiene flocculi, o è danneggiata o ha superato la data di scadenza, chiami il medico o il personale medico.

3b Verifichi la data di scadenza (EXP) e controlli la siringa preriempita.




- **Non** utilizzi la siringa se la data di scadenza è stata superata.
- **Non** utilizzi la siringa preriempita se:
 - il cappuccio di protezione dell'ago è assente o non è saldamente fissato;
 - presenta crepe o parti rotte;
 - è caduta su una superficie dura o è caduta senza il cappuccio di protezione dell'ago.
- Si assicuri di avere il medicamento giusto e la dose giusta.



3c

Scelga 1 di queste sedi di iniezione.



- Scelga una sede di iniezione nell'area dell'addome (pancia) o delle cosce.
- La persona che la assiste può praticare l'iniezione anche nella parte superiore esterna del braccio o sui glutei.
- Per ogni iniezione scelga una sede differente.
- Le aree indicate in blu sono le sedi di iniezione raccomandate.
- Si lavi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- Pulisca la sede di iniezione con una salvietta imbevuta di alcol.
- Lasci asciugare la pelle all'aria.
- Non tocchi più l'area pulita prima di praticare l'iniezione.


Importante: eviti le zone in cui la pelle è sensibile, arrossata o indurita o in cui sono presenti lesioni.

4

Iniezione di WEZENLA

Importante: non rimuova il cappuccio di protezione dell'ago finché non è pronto per l'iniezione di WEZENLA (entro 5 minuti), poiché il medicamento può seccarsi.






4a Tenga la siringa in corrispondenza del corpo della siringa e rimuova il cappuccio dell'ago sfilandolo lino

- **Non** tenga la siringa dallo stantuffo o dalla testa dello stantuffo mentre sfila il cappuccio di protezione dell'ago.
- **Non** ruoti né pieghi il cappuccio di protezione dell'ago.
- **Non** rimetta **mai** il cappuccio di protezione dell'ago. In questo modo l'ago può essere danneggiato.
- **Non** tocchi l'ago dopo aver rimosso il cappuccio di protezione dell'ago.
- **Non** appoggi la siringa su superfici dopo aver rimosso il cappuccio.
- **Non** cerchi di rimuovere le bolle d'aria. Possono essere visibili delle bolle d'aria; questo è normale.
- Sulla punta dell'ago può comparire una goccia di medicamento; questo è normale.

4b Pizzicare la pelle attorno alla sede di iniezione prima di eseguire l'iniezione.

PIZZICARE




- Con una mano pizzichi delicatamente la pelle per l'iniezione tra il pollice e l'indice per formare una plica di p
- Se possibile, la plica di pelle deve avere una larghezza di circa 5 cm.

Importante: pizzichi la pelle per formare una plica di pelle fino al completamento c

4c Inserisca l'ago nella pelle pizzicata.

INSERIRE





- Inserisca l'ago nella pelle pizzicata a un angolo di 45 gradi.
- **Non** appoggi il dito sullo stantuffo della siringa mentre inserisce l'ago poiché in questo modo può andare persa parte del medicamento.

4d

Prema lentamente la testa dello stantuffo con il pollice verso il basso fino all'arresto, fino a quando non sia completamente posizionata tra le clip di protezione dell'ago. Tenga le dita come mostrato nella figura.

INIETTARE



- **Non** tiri **mai** indietro lo stantuffo della siringa.
- **Non** rimuova la siringa finché non è stato iniettato tutto il medicamento.

4e

Tenga premuto il pollice sulla testa dello stantuffo ed estraiga l'ago dalla pelle.

SOLLEVARE



- Rilasci la pelle dopo aver estratto l'ago.
- Rimuova lentamente il pollice dalla testa dello stantuffo. In questo modo la siringa preriempita vuota si muove verso l'alto fino a quando l'intero ago non è completamente coperto dalla protezione dell'ago.

Se è necessaria una seconda iniezione

4f Ripeta i passaggi da 2a a 4e se è necessaria una seconda iniezione.

- Controlli la prescrizione medica per verificare la dose necessaria.
- Se la dose è di 90 mg, riceverà una siringa preriempita da 90 mg o due siringhe preriempite da 45 mg.
 - Se ha ricevuto due siringhe preriempite da 45 mg per una dose di 90 mg, dovrà effettuare una seconda iniezione immediatamente dopo la prima.
 - Ripeta i passaggi da 2a a 4e per la seconda iniezione utilizzando una nuova siringa di WEZENLA.
 - Scelga una sede di iniezione diversa per la seconda iniezione.

5 Smaltimento di WEZENLA e controllo della sede di iniezione

Importante: non rimetta il cappuccio di protezione dell'ago sulla siringa.

5a Riponga la siringa usata e il cappuccio di protezione dell'ago in un contenitore per lo smaltimento di og subito dopo l'uso.



- **Non** riutilizzi la siringa.

Importante: la siringa non deve essere gettata (smaltita) nei rifiuti domestici.

5b Controlli la sede di iniezione.





- **Non** strofini la sede di iniezione.
- In caso di fuoriuscita di sangue, preme un batuffolo di cotone idrofilo o garza sulla sede di iniezione.
- Se necessario, applichi un cerotto.

