

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

VICKS Nasivin Classic Menthol, spray nasale, soluzione

Che cos'è VICKS Nasivin Classic Menthol e quando si usa?

VICKS Nasivin Classic Menthol è una soluzione per curare la mucosa nasale congestionata e per favorire la respirazione attraverso il naso in caso di raffreddore. VICKS Nasivin Classic Menthol, spray nasale contiene oximetazolina cloridrato. L'applicazione di VICKS Nasivin Classic Menthol determina la vasocostrizione dei vasi sanguigni con conseguente riduzione della congestione. La respirazione nasale ne risulta migliorata e l'ipersecrezione nasale ridotta. Il prodotto è efficace generalmente dopo 5–10 minuti ed il suo effetto dura per circa 6 ore.

Quando non si può usare VICKS Nasivin Classic Menthol?

Questo farmaco non va usato nei bambini al di sotto dei 6 anni ed in caso di ipersensibilità all'oximetazolina o a uno degli altri costituenti. Non impiegare il prodotto in caso di infiammazione della mucosa nasale (rinite secca), infiammazioni o lesioni cutanee in corrispondenza delle narici o in presenza di glaucoma ad angolo chiuso.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di VICKS Nasivin Classic Menthol?

In caso di disturbi cronici al naso, informare il medico. VICKS Nasivin Classic Menthol non va usato senza prescrizione medica per più di 5–7 giorni perché, in caso di uso prolungato, potrebbe manifestarsi una lesione o un'infiammazione della mucosa nasale, accompagnata da sintomi simili a quelli del raffreddore. Usare con prudenza nei pazienti in terapia con determinati medicinali antidepressivi (inibitori della MAO) o che siano stati trattati con tali medicinali nelle ultime due settimane, in caso di ipertensione arteriosa, malattie cardiocircolatorie, angina pectoris nonché ipertiroidismo e diabete mellito.

Il prodotto va usato con prudenza in particolare se vengono impiegati antipertensivi, psicofarmaci e medicinali per la malattia di Parkinson.

Questo medicamento contiene 0.01 mg di benزالconio cloruro per erogazione, pari a 0.2 mg per ml. Benزالconio cloruro può causare irritazione e gonfiore all'interno del naso, specialmente se usato per lunghi periodi.

Questo medicamento contiene 0.1 mg di alcool benzilico per unità di somministrazione, pari a 2 mg per ml. L'alcool benzilico può causare reazioni allergiche e lievi irritazioni locali.

In caso di uso prolungato e in dosaggio superiore a quello consigliato, questo medicamento può ridurre la capacità di guidare e di utilizzare macchine.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.



Si può usare VICKS Nasivin Classic Menthol durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza o l'allattamento può usare VICKS Nasivin Classic Menthol solamente su prescrizione del medico.

Come usare VICKS Nasivin Classic Menthol?

Adulti e bambini dai 6 anni: 1–2 nebulizzazioni per narice ogni 6–8 ore, salvo diversa indicazione del medico. Durata massima del trattamento 5–7 giorni.

Soffiare il naso. Togliere il cappuccio dallo spray. Tenere il flacone in posizione verticale. Prima di usare il prodotto per la prima volta, azionare ripetutamente la pompetta fino ad ottenere una nebulizzazione omogenea. Introdurre leggermente nella narice l'estremità dello spray dosatore, rilasciare 1–2 spruzzi e contemporaneamente inspirare l'aerosol respirando con il naso.

VICKS Nasivin Classic Menthol non può essere somministrato a lattanti e bambini sotto i 6 anni. In caso di uso prolungato oltre i 7 giorni dev'essere consultato il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere VICKS Nasivin Classic Menthol?

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Alla cessazione dell'effetto, è stato spesso riscontrato un aumento temporaneo dell'irrorazione sanguigna a carico della mucosa nasale.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Sensazioni anomale, irritazione, bruciore e secchezza della mucosa nasale, della bocca e della gola, starnuti, nausea, mal di testa, irritazione e arrossamento degli occhi, insonnia, nervosismo, tremore, agitazione, ansia, irritabilità, ipertensione arteriosa, accelerazione del battito cardiaco o palpitazioni, aritmie cardiache (irregolarità del battito del cuore), alterazione dello svuotamento vescicale. Tali effetti cessano riducendo la dose o discontinuando il trattamento. Talvolta, in particolare alla cessazione dell'effetto, può insorgere una sensazione spiccata di 'naso chiuso' e di perdita dell'effetto.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Reazioni di ipersensibilità (allergie).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo la prima apertura, non utilizzare per più di 12 mesi.

Indicazioni per lo smaltimento



Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazioni concernenti l'immagazzinamento

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene VICKS Nasivin Classic Menthol?

Principio attivo

1 ml di soluzione contiene: Oximetazolina cloridrato 0.5 mg.

1 nebulizzazione (= 0.05 ml) contiene 0.025 mg di oximetazolina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Sorbitolo liquido 70% (non cristallizzabile) (E 420), sodio citrato diidrato (E 331), acido citrico (E 330), sodio edetato, polisorbato 80 (E 433), canfora racemica, cineolo, levomentolo, benzalconio cloruro, alcool benzilico, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

51764 (Swissmedic).

Dove è ottenibile VICKS Nasivin Classic Menthol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

VICKS Nasivin Classic Menthol, spray nasale, soluzione da 15 ml, corrisponde a 265 nebulizzazioni.

Titolare dell'omologazione

Procter & Gamble International Operations SA, Lancy.

Domicilio: 1213 Petit-Lancy.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

