

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan peuvent être utilisées en cas de troubles de la prostate.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan peuvent être prises simultanément. Lorsque les troubles de la prostate persistent ou s'aggravent, il est nécessaire de consulter un médecin.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas et selon la gravité des symptômes, prendre 10 gouttes toutes les 1 à 2 heures, puis diminuer la fréquence de la dose après amélioration. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin, ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15-25° C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 36 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

10 ml contiennent: Chimaphila umbellata D3 1 ml, Clematis vitalba D3 1 ml, Conium maculatum D5 1 ml, Ferrosi picras D4 1 ml, Pareira brava D2 1 ml, Populus tremuloides D3 1 ml, Pulsatilla pratensis D3 1 ml, Serenoa repens (Sabal serrulatum) D2 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 36 % vol. d'alcool.



Numéro d'autorisation

45054

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sans ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabricant

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 07/2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

