

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Viburcol, Liquide oral

Médicament homéopathique

Quand Viburcol est-il utilisé?

Selon la conception homéopathique, Viburcol peut être utilisé en cas d'états d'agitation et d'irritabilité avec ou sans fièvre, surtout chez les nourrissons et les enfants (p.ex. poussées dentaires, coliques intestinales légères, insomnie) ainsi que pour le traitement symptomatique d'infections fréquentes.

L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si Viburcol peut être pris simultanément.

Quand Viburcol ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution?

En cas d'allergie connue (hypersensibilité) à l'un des composants du médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par monodose de 1,0 ml, c.-à-d. qu'il est essentiellement « sans sodium ».

En cas de vulnérabilité aux refroidissements chez les enfants, il est recommandé de consulter un médecin. Si les états d'agitation persistent, il faut avoir recours à une aide médicale.

En cas de fièvre élevée ou d'aggravation de l'état clinique, il est indiqué de consulter à temps le médecin, en particulier s'il s'agit d'un enfant. La survenue d'une forte fièvre chez les enfants de moins de 2 ans doit par principe être élucidée par un médecin.

Chez les nourrissons âgés de moins d'un an, il convient de consulter un médecin en cas de fièvre persistante supérieure à 38 °C. Les enfants âgés de moins de 2 ans doivent être examinés par un médecin au plus tard dès le deuxième jour de maladie.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Viburcol peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?



Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Comment utiliser Viburcol?

En l'absence de prescription contraire, posologie standard:

Adultes et adolescents dès 12 ans

1 monodose 3 fois par jour

Enfants:

Au-dessous de 2 ans: 6 gouttes 3 x jour

2-5 ans: 9 gouttes 3 x jour

6-11 ans: 12 gouttes 3 x jour

Dosage en aigu:

Adultes et adolescents dès 12 ans

1 monodose toutes les 1/2-1 heure, jusqu'à 12 x jour

Enfants:

Au-dessous de 2 ans: 6 gouttes toutes les 1/2-1 heure, jusqu'à 12 x jour

2-5 ans: 9 gouttes toutes les 1/2-1 heure, jusqu'à 12 x jour

6-11 ans: 12 gouttes toutes les 1/2-1 heure, jusqu'à 12 x jour

Mode d'utilisation

1. Le récipient monodose est destiné à un usage unique.
2. Ouvrez le récipient monodose juste avant l'emploi.
3. Séparez le récipient monodose en tournant et en détachant la bandelette. Le clapet d'obturation s'ouvre par un mouvement de rotation. Il ne faut pas toucher l'ouverture.
4. Verser la dose de Viburcol, liquide à avaler, goutte à goutte, de préférence sous la langue.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Viburcol peut-il provoquer?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec Viburcol et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de Viburcol n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné.



Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «A utiliser jusqu'au» sur le récipient.

Délai d'utilisation après ouverture

A utiliser dans les 6 mois après ouverture du sachet.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25°C.

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Viburcol?

1 récipient monodose de 1,0 ml (=17 gouttes) contient:

Principes actifs

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 11,0 mg

Matricaria recutita (HAB) D4 25,0 mg

Plantago major (HAB) D4 25,0 mg

Pulsatilla pratensis (HAB) D6 50,0 mg

Solanum dulcamara (HAB) D6 25,0 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D8 75,0 mg

Excipients

eau pour injection, chlorure de sodium

Numéro d'autorisation

63260 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Viburcol? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage de 15 récipients monodoses à 1ml.

Titulaire de l'autorisation

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Fabricant

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

