

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Viburcol, liquido orale

Medicamento omeopatico

Quando si usa Viburcol?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Viburcol può essere usato in caso di stati di agitazione e irritabilità con o senza febbre, soprattutto nei lattanti e nei bambini (es. nella dentizione, in caso di lievi dolori addominali, insonnia) e nel trattamento sintomatico di comuni infezioni.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Viburcol.

Quando non si può assumere Viburcol e quando il suo uso richiede prudenza?

In caso di allergia (ipersensibilità) nota a uno dei componenti del medicamento. Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per monodosi da 1,0 ml, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

In caso di predisposizione ai raffreddamenti nei bambini, si raccomanda di consultare il medico. Se lo stato di agitazione persiste, consultare il medico. In caso di febbre elevata o se lo stato peggiora, si raccomanda di rivolgersi subito al medico, soprattutto nei bambini. Nei bambini sotto i 2 anni, la comparsa di febbre elevata va sottoposta in generale ad accertamenti da parte del medico.

Nei bambini piccoli nel primo anno di vita, in caso di febbre persistente superiore a 38 °C è necessario consultare un medico. I bambini di età inferiore ai 2 anni devono essere visitati da un medico al più tardi dal secondo giorno di malattia.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!).

Si può assumere Viburcol durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Viburcol?



Salvo diversa prescrizione del medico:

Posologia standard:

adulti e adolescenti a partire dai 12 anni:

1 monodose 3 volte al giorno

Bambini:

sotto i 2 anni: 6 gocce 3 volte al giorno

2-5 anni: 9 gocce 3 volte al giorno

6-11 anni: 12 gocce 3 volte al giorno

Dosaggio acuto:

adulti e adolescenti a partire dai 12 anni:

1 monodose ogni 1/2 - 1 ora, fino a 12 volte al giorno.

Bambini:

sotto i 2 anni: 6 gocce ogni 1/2 - 1 ora, fino a 12 volte al giorno

2-5 anni: 9 gocce ogni 1/2 - 1 ora, fino a 12 volte al giorno

6-11 anni: 12 gocce ogni 1/2 - 1 ora, fino a 12 volte al giorno

Modalità di impiego:

1. I contenitori monodose sono monouso.
2. Aprire il contenitore monodose poco prima dell'uso.
3. Separare il contenitore monodose ruotandolo e staccando la striscia. Il cappuccio di chiusura si apre ruotandolo. Non toccare l'apertura.
4. Versare la quantità raccomandata di gocce preferibilmente sotto la lingua.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Viburcol?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Viburcol e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Viburcol. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «verwendbar bis» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Periodo di validità di 6 mesi dopo l'apertura della bustina.



Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 25 °C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Viburcol?

1 contenitore monodose da 1,0 ml (= 17 gocce) contiene:

Principi attivi

Atropa bella-donna (HAB) D6 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 11,0 mg

Matricaria recutita (HAB) D4 25,0 mg

Plantago major (HAB) D4 25,0 mg

Pulsatilla pratensis (HAB) D6 50,0 mg

Solanum dulcamara (HAB) D6 25,0 mg

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D8 75,0 mg

Sostanze ausiliarie

Acqua per preparazioni iniettabili, cloruro di sodio

Numero dell'omologazione

63260 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Viburcol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Viburcol è disponibile in confezioni da 15 monodosi da 1 ml ciascuna.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlintach

Fabbricante

Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532 Baden-Baden, Deutschland

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

