

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo, che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Tussantiol®

APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG

Che cos'è il Tussantiol e quando si usa?

Il Tussantiol contiene il principio attivo carbocisteina. Lo si usa in caso di eccessiva produzione di muco viscoso nelle malattie da raffreddamento. Il Tussantiol facilita l'espettorazione del secreto viscoso e ristagnante. La respirazione è facilitata, lo stimolo a tossire e l'espettorazione di muco diminuiscono.

Su prescrizione medica il Tussantiol si può usare anche in certe malattie infiammatorie delle vie respiratorie, come ad esempio della laringe (laringite), della trachea (tracheite) o dei seni paranasali (sinusite), o in caso di bronchite cronica, quando queste malattie sono associate a produzione di muco viscoso difficile o impossibile da espellere.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Può coadiuvare l'efficacia del Tussantiol bevendo a sufficienza nel corso della terapia.

Fumare contribuisce all'eccessiva produzione di muco bronchiale e all'insorgenza della tosse. Se fuma, rinunciando a farlo favorirà l'effetto del Tussantiol.

Questo medicamento contiene 3.6 g carboidrati digeribili per 15 ml.

Quando non si può usare il Tussantiol?

Il Tussantiol non si deve prendere in caso di ipersensibilità conosciuta a uno dei suoi costituenti (specialmente il conservante E 217 e E 219 in caso di cosiddetta allergia ai paraidrossibenzoati), in presenza di un'ulcera gastrica o duodenale acuta, come pure di un'intolleranza congenita allo zucchero di canna (cosiddetta intolleranza al fruttosio), e non lo si può somministrare ai bambini di meno di 2 anni.

Quando è richiesta prudenza nell'uso del Tussantiol?

Durante una terapia col Tussantiol non deve prendere (o somministrare al suo bambino) contemporaneamente dei medicinali che calmano la tosse, perché essi inibiscono il riflesso della tosse, ciò che può causare un ristagno del muco bronchiale fluidificato con rischio di improvvisa difficoltà di respirazione e di polmonite.

Se in precedenza, dopo aver preso un medicamento con lo stesso principio attivo carbocisteina, ha constatato delle eruzioni sulla pelle o dei disturbi respiratori deve assolutamente informarne il medico, il farmacista o il droghiere prima di cominciare a prendere il Tussantiol. In caso di reazioni di ipersensibilità cessare la terapia e consultare un medico.

La prudenza si impone nei pazienti che hanno sofferto in passato di ulcera gastrica o duodenale.

Se la tosse dura più di 14 giorni bisogna consultare un medico per accertare la malattia da cui ha origine la tosse.

Sostanze ausiliarie di interesse speciale

- Etanolo: questo medicamento contiene $\leq 8,4$ mg di alcol per 15 ml (3 misurini) corrispondenti a $\leq 0,7\%$ Vol. La quantità in 15 ml di questo medicinale equivale a meno di 300 ml di birra o 125 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicinale non ha effetti evidenti.
- Sorbitolo: questo medicamento contiene 6 g di sorbitolo per 15 ml (3 misurini). Il sorbitolo può causare disturbi gastrointestinali e può avere un lieve effetto lassativo.



Il sorbitolo è una fonte di fruttosio. Parli con il medico prima che lei (o suo/a figlio/a) prenda o riceva questo medicinale se il medico le ha diagnosticato (o a suo/a figlio/a) che lei (o suo/a figlio/a) ha un'intolleranza ad alcuni zuccheri o se ha un'intolleranza ereditaria al fruttosio (HFI), una rara condizione congenita per la quale una persona non è in grado di scomporre il fruttosio.

- Propile paraidrossibenzoato sodico ed E 219: possono causare reazioni allergiche, comprese reazioni tardive.
- Sodio: Questo medicamento contiene 100,8 mg di sodio (componente principale del sale da cucina/da tavola) per 15 ml (3 misurini). Ciò corrisponde al 5% dell'assunzione giornaliera massima di sodio nella dieta raccomandata per un adulto.

Informi il medico, il farmacista o il droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre allergie o assume o applica altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa).

Si può somministrare il Tussantiol durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, prevede una gravidanza oppure allatta, per prudenza dovrebbe rinunciare ai medicinali. Non si sa se il principio attivo del Tussantiol possa avere degli effetti nocivi sul bimbo nel grembo materno o sul lattante. Perciò, per prudenza, non prenda Tussantiol durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare il Tussantiol?

Salvo diversa prescrizione, prendere prima dei pasti col cucchiaino-misurino accluso:

Adulti: 3 misurini (15 ml) 3 volte al giorno.

Adolescenti sopra i 12 anni: 3 misurini (15 ml) 2 volte al giorno.

Bambini sopra i 5 anni: 1 misurino (5 ml) 3 volte al giorno.

Bambini da 2 a 5 anni: 1 misurino (5 ml) 2 volte al giorno.

Nei bambini di età inferiore a 2 anni Tussantiol non è adatto.

Si attenga alla posologia indicata in questo foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere il Tussantiol?

Con l'assunzione di Tussantiol possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: Occasionalmente può manifestarsi mal di testa e dei disturbi gastrointestinali come nausea, dolori di ventre, vomito e diarrea. In casi isolati possono manifestarsi delle reazioni di ipersensibilità (allergie) con prurito, pomfi, eruzione sulla pelle o difficoltà di respirazione. In questo caso deve smettere subito di prendere il Tussantiol e avvertire un medico.

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, si rivolga al medico, al farmacista o al farmacista. Ciò vale anche in particolare per gli effetti collaterali che non sono elencati in questo foglio.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori della portata dei bambini, a temperatura ambiente (15-25 °C) e al riparo della luce.

Si può usare il medicamento solo fino alla data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di documentazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene il Tussantiol?

15 ml di Tussantiol contengono:

Principi attivi

carbocisteina 750 mg

Sostanze ausiliarie



Etanolo 96%, idrossido di sodio, sorbitolo liquido (non cristallizzabile), acido citrico monoidrato, acqua purificata, monoammonio di glicirrizina, aromi (banana, ciliegia), zucchero caramellato, propil-4-idrossibenzoato-sodio (E 217), metil-4-idrossibenzoato di sodio (E 219).

Numero dell'omologazione

47110 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile il Tussantiol? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Flaconi da 200 ml con misurini à 5 ml.

Titolare dell'omologazione

APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

