

Che cos'è Muxol 10 mg e quando si usa?

Muxol 10 mg è un lassativo di contatto che agisce a livello dell'intestino crasso stimolando il peristaltismo intestinale.

Muxol 10 mg si usa per il trattamento di breve durata delle costipazioni occasionali, p.es. in caso di cambio nell'alimentazione, di cambio di spostamenti (viaggio) o di riposo a letto.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

In caso di costipazione, cercare di avere un'alimentazione ricca in fibre (verdura, frutta, pane integrale), di bere molto e regolarmente e di avere un'attività fisica sufficiente (sport).

In caso di costipazione cronica, conviene consultare il medico per determinarne l'origine.

Un controllo medico è indispensabile sui bambini e su pazienti colpiti da malattie gravi.

Quando non si può usare Muxol 10 mg?

Muxol 10 mg non deve essere preso in caso di affezioni del tratto gastrointestinale, in caso di rischio di occlusione intestinale (ileo), di affezioni addominali infiammatorie, di disidratazione grave o d'ipersensibilità al bisacodile.

Non si deve usare Muxol 10 mg in caso di nausea, vomito, dolori addominali o altri segni evocatori di un'appendicite.

In caso di malattie gravi, chiedere il consiglio d'un medico.

Non si deve somministrare Muxol 10 mg su bambini di meno di 6 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Muxol 10 mg?

Si deve somministrare Muxol 10 mg su bambini al disotto di 12 anni solo su prescrizione medica.

Muxol 10 mg deve essere preso solo occasionalmente e no oltre 1 a 2 settimane. I trattamenti prolungati si devono fare sotto controllo medico.

Se prende dei diuretici, corticosteroidi orali o medicinali per il cuore (digitalici), non deve prendere Muxol 10 mg senza l'avviso del suo medico (possibilità di interazioni).

Si consiglia di differire di almeno mezz'ora la presa di Muxol 10 mg dopo la somministrazione di medicinali contro i bruciori o ulcera di stomaco (antacidi).

In caso di diarrea o di dolori addominali, conviene interrompere il trattamento.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o se assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere Muxol 10 mg durante la gravidanza o l'allattamento?

Non sono state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico.

Come usare Muxol 10 mg?

Salvo diversa prescrizione del medico, la dose usuale è:

Adulti e adolescenti a partire da 12 anni: 1-2 confetti secondo il grado di costipazione.

Bambini da 6 a 12 anni: solo su prescrizione medica, 1 confetto.

Inghiottire i confetti senza masticarli.



I confetti sono da prendere la sera al coricarsi, affinché l'evacuazione delle feci abbia luogo il mattino seguente. Quando i confetti sono presi la sera, l'azione lassativa si manifesta dopo ca. 10 ore senza perturbare il sonno e causa una o due espulsioni di feci il mattino seguente.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Muxol 10 mg?

Con l'assunzione di Muxol 10 mg possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Dopo la presa di Muxol 10 mg, le urine alcaline possono colorarsi in rosso. Si tratta di un fenomeno normale di cui non c'è motivo di preoccuparsi.

In rari casi Muxol 10 mg può provocare delle flatulenze, crampi addominali o reazioni d'ipersensibilità.

Una dose eccessiva (iperdosaggio) o un uso prolungato o frequente può provocare diarrea con perdita di acqua e disturbi del sistema minerale (in particolare perdita di potassio). Ne possono risultare dei disturbi della funzione cardiaca ed una debolezza muscolare, particolarmente se il paziente prende diuretici, corticosteroidi o medicinali per il cuore (digitalici).

In caso di diarrea, interrompere il trattamento.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Muxol 10 mg nella sua confezione d'origine, a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Muxol 10 mg?

1 confetto contiene come principio attivo 10 mg di bisacodile; contiene pure 0,1 g di saccarosio, dietilftalato e altri eccipienti.

Numero dell'omologazione

26339 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Muxol 10 mg? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezione da 30 confetti.

Titolare dell'omologazione

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2007 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

