

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Akne-mycin® 2000 Pommade

Almirall AG

Qu'est-ce que l'Akne-mycin 2000 et quand doit-il être utilisé?

La pommade Akne-mycin 2000 contient comme principe actif l'antibiotique érythromycine.

La pommade est utilisée sur prescription médicale pour le traitement externe des formes inflammatoires d'acné s'accompagnant de papules et de pustules (acné papulo-pustuleuse).

L'érythromycine pénètre dans les canaux sécréteurs des glandes sébacées et y déploie son action spécifique contre les bactéries responsables de l'apparition de l'acné.

La base de la pommade utilisée a la capacité de lier le sébum de la peau qui est souvent produit en excès lors d'acné. En nettoyant la peau traitée par Akne-mycin 2000, le sébum est éliminé de la surface de la peau.

Quand Akne-mycin 2000 ne doit-il pas être utilisé?

La préparation ne doit pas être utilisée en cas d'hypersensibilité à l'érythromycine, à l'alcool cetostéarylique ou à un autre constituant de la préparation.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Akne-mycin 2000?

La prudence est de rigueur si vous prenez simultanément des antibiotiques. L'effet de ces antibiotiques et celui d'Akne-mycin 2000 peuvent s'entraver mutuellement.

Il faut éviter l'utilisation simultanée de produits cosmétiques car ils peuvent entraver l'effet d'Akne-mycin 2000.

L'excipient alcool cetostéarylique peut provoquer des irritations cutanées locales (p.ex. dermatite de contact) (voir «Quand Akne-mycin 2000 ne doit-il pas être utilisé?»)

Le butylhydroxytoluène peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact), ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Ce médicament contient un parfum à base d'alcool benzylique, de benzoate de benzyle, de salicylate de benzyle, de cinnamaldéhyde, d'alcool cinnamique, de citral, de citronellol, d'eugénol, de farnésol, de géraniol, d'hydroxycitronellal, d'isoeugénol, de D-limonène et de linalol. Ces substances peuvent provoquer des réactions allergiques.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!).

Akne-mycin 2000 peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, souhaitez l'être, ou si vous allaitez, vous devriez, par mesure de précaution, renoncer à tout médicament ou n'en utiliser que si cela est absolument nécessaire.

C'est le médecin qui décide d'une utilisation de ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement. Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Si votre médecin vous a prescrit l'utilisation d'Akne-mycin pendant l'allaitement, veillez à ce que la bouche du nourrisson n'entre pas en contact avec les zones de peau traitées.



Comment utiliser Akne-mycin 2000?

Adultes et adolescents

Sauf prescription contraire, appliquer Akne-mycin 2000 matin et soir en couche mince sur les zones de peau atteintes.

Avant d'appliquer une nouvelle couche d'Akne-mycin 2000, il faut veiller aux points suivants:

1. Enlever les résidus de produit en lavant la peau abondamment à l'eau tiède pour éliminer le sébum émulsionné.
2. Bien sécher la peau.

La durée du traitement par la pommade Akne-mycin 2000 ne doit pas dépasser 4 à 6 semaines.

Enfants

La pommade Akne-mycin 2000 ne doit pas être utilisée chez les enfants âgés de moins de 12 ans, car il n'existe pas de données sur la sécurité et l'efficacité dans ce groupe d'âge.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Akne-mycin 2000 peut-il provoquer?

L'utilisation d'Akne-mycin 2000 peut provoquer les effets secondaires suivants:

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000)

Dans de très rares cas, une légère rougeur de la peau ou une légère desquamation peuvent se produire au début de traitement. Ces manifestations disparaissent à la poursuite du traitement.

Dans de très rares cas, les symptômes mentionnés ci-dessus peuvent aussi être l'expression d'une réaction d'hypersensibilité (eczéma allergique de contact).

Si vous observez des altérations de la peau (telles qu'éruption cutanée, formation de cloques ou décollement de la peau), il pourrait s'agir de signes d'une réaction d'hypersensibilité. Dans ce cas, veuillez immédiatement contacter votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Akne-mycin 2000 ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Stabilité après ouverture

Une fois entamé, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Mention concernant l'élimination des médicaments

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Rapportez les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages dans un point de remise (pharmacies, cabinets médicaux) ou un centre de collecte. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de la portée des enfants.

Remarques complémentaires



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Akne-mycin 2000?

1 g de pommade contient:

Principe actif

20 mg d'érythromycine.

Excipients

Paraffine liquide, vaseline blanche, butylhydroxytoluène (E321), talc (E553b) paraffine solide, dioxyde de titane (E171), phosphate de trilaureth-4, Oléyloléate, phosphate de trilaneth-4, Sorbitol liquide 70% (non cristallisable, E420), alcool cetostéarylique, parfum (Gardénia, contient de l'alcool benzylique (E1519), du benzoate de benzyle, du salicylate de benzyle, de l'aldéhyde cinnamique, de l'alcool cinnamique, du citral, du citronellol, de l'eugénol, du farnésol, du géraniol, de l'hydroxycitronellal, de l'isoeugénol, du D-limonène, du linalol), eau purifiée.

Numéro d'autorisation

48142 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Akne-mycin 2000? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Tube de 25 g.

Titulaire de l'autorisation

Almirall AG, 8304 Wallisellen.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en janvier 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

