

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

NeoCitran Espettorante, Sciroppo

Haleon Schweiz AG

Che cos'è NeoCitran Espettorante e quando si usa?

NeoCitran Espettorante è un medicamento contro la tosse che fluidifica il muco viscoso nelle vie respiratorie, favorisce l'espettorazione e calma lo stimolo della tosse. NeoCitran Espettorante viene usato per calmare la tosse e stimolare l'espettorazione, soprattutto nelle malattie da raffreddamento delle vie respiratorie superiori.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

L'effetto di NeoCitran Espettorante viene favorito da un'abbondante assunzione di liquidi. Il fumare contribuisce alla produzione di muco nelle vie respiratorie e provoca tosse («tosse del fumatore»). Può sostenere l'azione di NeoCitran Espettorante evitando di fumare.

NeoCitran Espettorante sciroppo è dolcificato con saccarina e sorbitolo. Perciò è indicato anche per i diabetici.

Quando non si può usare NeoCitran Espettorante sciroppo?

Non si può usare NeoCitran Espettorante sciroppo in caso di ipersensibilità al principio attivo guaifenesina o a una delle sostanze ausiliarie (vedi: «Cosa contiene NeoCitran Espettorante sciroppo?») o se lei soffre di una (rara) malattia ereditaria del metabolismo degli zuccheri, detta intolleranza al fruttosio. NeoCitran Espettorante sciroppo è edulcorato con sorbitolo che, una volta digerito, dà luogo alla formazione di fruttosio.

NeoCitran Espettorante sciroppo contiene 6 vol.-% di alcool. NeoCitran Espettorante sciroppo non è adatto per bambini e adolescenti inferiore ai 18 anni.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di NeoCitran Espettorante?

Voglia consultare un medico se

- le viene l'affanno,
- la tosse è accompagnata da espettorato misto a sangue o da una secrezione eccessiva di muco,
- la tosse è persistente o cronica, per es. nei fumatori, negli asmatici, in caso di bronchite cronica o enfisema (dilatazione degli alveoli polmonari).
- Se la tosse dura più di 7 giorni, peggiora, si ripresenta o è accompagnata da febbre, eruzione cutanea o mal di testa persistente, sospenda l'uso di NeoCitran Espettorante e consulti il medico. La tosse persistente può essere segno di una malattia seria.

È necessaria prudenza nel caso di affezioni gastrointestinali, di funzioni renali ridotte o nell'eventualità in cui lei soffra di un tipo particolare di astenia muscolare (cosiddetta miastenia grave).

Se dovessero manifestarsi reazioni di ipersensibilità (vedi sotto: «Quali effetti collaterali può avere NeoCitran Espettorante?»), deve interrompere subito il trattamento e consultare un medico il più presto possibile.

Le consigliamo di rinunciare a prendere contemporaneamente medicinali che diminuiscono o eliminano lo stimolo della tosse (cosiddetti tossifughi), perché possono portare a un'indesiderata congestione del muco bronchiale reso fluido da NeoCitran Espettorante, con il conseguente pericolo di uno spasmo bronchiale e di una polmonite.



Nei casi in cui NeoCitran Espettorante è assunto al contempo di determinati tranquillanti (sedativi) o farmaci per rilassare la muscolatura (rilassanti muscolari), l'effetto di questi ultimi può vedersi aumentato dalla guaifenesina.

Informazioni sulle sostanze ausiliarie:

Etanolo:

NeoCitran Espettorante sciroppo contiene 6 vol % di etanolo (alcool). Con ogni dose singola (10 ml) vengono assunti fino a 470 mg di alcool, equivalenti a 12 ml di birra, 5 ml di vino. Rischio per la salute per i pazienti affetti da alcolismo. Da tenere in considerazione nelle donne in gravidanza o in allattamento, nei bambini e nei gruppi ad alto rischio come le persone affette da patologie del fegato o epilessia.

Sorbitolo (E 420):

NeoCitran Espettorante sciroppo contiene sorbitolo (1,4 g/5 ml). Sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico le ha detto che lei è intollerante ad alcuni zuccheri, o se ha una diagnosi di intolleranza ereditaria al fruttosio, una rara malattia genetica per cui i pazienti non riescono a trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei prenda questo medicamento (vedi «Quando non si può usare NeoCitran Espettorante sciroppo?»)

Sorbitolo può causare problemi gastrointestinali e avere un lieve effetto lassativo.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 5 ml, cioè essenzialmente «senza sodio».

Anche se viene preso secondo le istruzioni, NeoCitran Espettorante può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicamentos (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si può somministrare NeoCitran Espettorante durante la gravidanza o l'allattamento?

NeoCitran Espettorante non deve essere assunto durante la gravidanza, a meno che è stato consultato il medico.

Le donne che allattano non devono prendere questo medicamento.

Come usare NeoCitran Espettorante sciroppo?

Solo per uso orale. Il dosaggio raccomandato non deve essere superato.

Adulti:

5 a 10 ml 4 volte al giorno.

Durata massima di utilizzo senza parere medico: 7 giorni.

Non assumere NeoCitran Espettorante sciroppo con altri medicamentos contro la tosse o il raffreddore.

NeoCitran Espettorante sciroppo contiene 6% vol. di alcool e non è adatto per bambini e adolescenti inferiore ai 18 anni.

Utilizzare il misurino graduato fornito con l'imballaggio. Lavare e asciugare il misurino graduato dopo ogni utilizzazione e utente.

Oltre alla somministrazione del medicamento è consigliabile un abbondante apporto di liquidi (p. es. tè, succhi di frutta, ecc.).

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.



Quali effetti collaterali può avere NeoCitran Espettorante?

Terminare l'assunzione di NeoCitran Espettorante e informare immediatamente il medico se si manifesta uno o più dei seguenti sintomi che possono essere segni di una rara reazione allergica grave.

- eruzione cutanea (compresi orticaria, prurito),
- gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola,
- respirazione ansimante, asma, respiro corto, affanno, accelerazione del battito cardiaco, svenimento.

Come tutti i medicinali, NeoCitran Espettorante può avere degli effetti collaterali, sebbene non tutte le persone li manifestino. Possono manifestarsi disturbi gastrointestinali come ad esempio nausea, vomito, diarrea, oltre a sensazione di calore, capogiro o alterazioni del quadro ematico (la frequenza esatta di questi effetti collaterali non è nota).

In casi rari compaiono reazioni di ipersensibilità (allergie), che si manifestano fra l'altro con eruzioni cutanee, accelerazione del battito cardiaco e difficoltà respiratorie. Questo riguarda in particolare pazienti affetti da asma e da orticaria.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservare a 15–30 °C.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene NeoCitran Espettorante sciroppo?

Principio attivo

5 ml di sciroppo contengono 100 mg di guaifenesina.

Sostanze ausiliarie

Etanolo 6% vol. (corr. 5% peso/vol.), glicerina, saccarina sodica, sorbitolo (E 420) (1,4 g/5 ml corr. a 1,4 g di carboidrati); acqua depurata, aroma (liquirizia).

Numero dell'omologazione

12803 (Swissmedic).

Dove è ottenibile NeoCitran Espettorante sciroppo? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Sciroppo: imballo da 200 ml.

Titolare dell'omologazione



Haleon Schweiz AG, Risch.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

