

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il presente foglietto illustrativo, poiché contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

A.Vogel Gocce distensive, gocce orali, liquido

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è A.Vogel Gocce distensive e quando si usa?

A.Vogel Gocce distensive è un medicamento fitoterapeutico e contengono una tintura di passiflora fresca (*Passiflora incarnata* L., herba). La tintura si usa in caso di nervosismo in genere, agitazione nervosa, difficoltà nel prender sonno e durante il climaterio.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se i disturbi persistono per oltre un mese, occorre consultare il medico.

Quando non si possono assumere A.Vogel Gocce distensive e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Questo medicamento contiene fino a 480 mg di alcool (etanolo) per dose da 30 gocce, corrispondenti a 544 mg/ ml (68% v/v). La quantità in 30 gocce di questo farmaco corrisponde a meno di 12 ml di birra o 5 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicinale non ha effetti evidenti.

Il medicinale non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Informi il medico, il farmacista o il droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere A.Vogel Gocce distensive durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e nel periodo d'allattamento, oppure chiedere consiglio al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Come usare A.Vogel Gocce distensive?

Gli adulti e gli adolescenti a partire da 12 anni assumono 3 volte al giorno 10 gocce in poca acqua, mezz'ora prima dei pasti. Prima di coricarsi 25 – 30 gocce in poca acqua. I bambini dai 3 anni in poi assumono 3 volte al giorno 6 gocce in poca acqua, mezz'ora prima dei pasti. Prima di coricarsi 10 gocce in poca acqua.

Il medicinale non è indicato nei bambini di età inferiore a 3 anni, poiché l'uso in questo gruppo di pazienti non è stato sistematicamente valutato.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere A.Vogel Gocce distensive?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce distensive A.Vogel. Se osserva effetti collaterali si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere. Ciò vale particolarmente anche in caso di effetti collaterali non elencati in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il farmaco può essere utilizzato solo entro la data di scadenza riportata sulla confezione e contrassegnata con «EXP».

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25° C) e fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

L'intorbidimento che occasionalmente si verifica in tinture di piante fresche non ne pregiudica peraltro l'efficacia terapeutica.

Le confezioni scadute o non esaurite devono essere riportate al farmacista o al droghiere, affinché vengano smaltite.

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene A.Vogel Gocce distensive?

1 ml di liquido corrisponde a:

Principi attivi

910 mg di tintura di passiflora fresca (*Passiflora incarnata* L., herba), rapporto droga-solvente di estrazione 1: 7- 17, solvente di estrazione etanolo 65% (v/v).

Il medicinale contiene max. 68 vol.-% di alcol (544 mg di etanolo per 1 ml).

Sostanze ausiliarie

Nessuno

1 ml = 34 gocce

Numero dell'omologazione

39541 (Swissmedic)

Dove è ottenibile A.Vogel Gocce distensive? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica, in flaconi da 50 ml.

Titolare dell'omologazione

A.Vogel SA, CH-9325 Roggwil



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

Cronistoria delle revisioni

ID domanda	Tappa fondamentale	Data di creazione	Modifica	Iniziali
102617808	Verfügung Gutheissung 10.01.2023	10.01.2023	Anpassung an HmV4 A.109	fic
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO
TESTO	TESTO	DATA	TESTO	TESTO

