

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

CARBOTICON®, capsule

Leman SKL SA

Che cos'è Carboticon e quando si usa?

Carboticon combina due principi attivi con meccanismi d'azione complementari: il carbone attivo che possiede effetti assorbenti ed il simeticone dalle proprietà antischiumose.

Carboticon è attivo contro gli accumuli di gas nello stomaco e nell'intestino e ne favorisce l'eliminazione naturale. È indicato, quale trattamento sintomatico degli stati dispeptici e del meteorismo.

Una dose è costituita da una capsula blu - che libera il suo principio attivo a livello dello stomaco - ed una capsula rossa, acido-resistente che libera il suo principio attivo a livello dell'intestino. Questa particolare caratteristica permette di ottenere una liberazione progressiva dei principi attivi e, successivamente, una esplicazione totale dei loro effetti a livello dello stomaco e dell'intestino. I due principi attivi principali del Carboticon agiscono esclusivamente a livello del tratto gastro-intestinale e non penetrano nel circolo sanguigno.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Un cambiamento adeguato delle Sue abitudini alimentari e dietetiche è atto a migliorare in maniera naturale il Suo stato. Se il dosaggio è alto, si può osservare una colorazione più scura delle feci, ciò che non porta a nessuna conseguenza.

Quando non si può assumere Carboticon?

Carboticon non deve venire impiegato in caso di rischi di ostruzione intestinale (ileo). Ipersensibilità ad uno dei componenti del Carboticon.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Carboticon?

Visti gli effetti assorbenti del carbone, conviene assumere tutti gli altri farmaci separatamente dall'assunzione del Carboticon.

Informi il medico, il farmacista o il droghiere se soffre di un'altra malattia, è allergico, prendete già altri medicinali per uso interno o esterno (anche di vostra iniziativa).

Si può assumere Carboticon durante la gravidanza o l'allattamento?

Le esperienze fatte a tutt'oggi non hanno evidenziato, se il medicamento viene utilizzato conformemente all'uso a cui è destinato, alcun rischio per il bambino. Non è stato tuttavia condotto alcun studio scientifico sistematico. A titolo precauzionale dovreste rinunciare, se possibile, all'assunzione di medicinali durante la gravidanza o l'allattamento, oppure dovreste chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Come usare Carboticon?

Per gli adulti, in genere, viene adottata la seguente posologia: 1 dose (= 1 capsula blu et une capsule rosso) da inghiottire contemporaneamente 3 volte al giorno, prima dei pasti. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Non ci sono dati per l'uso di Carboticon nei bambini e negli adolescenti. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Carboticon?



Sono stati osservati i seguenti effetti collaterali: Orticaria, prurito, reazioni allergiche, dolore, vomito, malessere, costipazione o diarrea, edema del viso e delle estremità. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Carboticon deve venire conservato nella confezione originale chiusa a temperatura ambiente (15-25°C). Il medicamento deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Carboticon?

1 dose = 2 capsule gemelle

Principi attivi

Ogni capsula contiene 140 mg di carbone attivo, 45 mg di simeticone.

Sostanze ausiliarie

Monooleato di sorbitano, polisorbato 80,

Capsula blu: Gelatina, indigotina (E 132) ed biossido di titanio (E171).

Capsula rossa: Gelatina, eritrosina (E 127), indigotina (E 132) et biossido di titanio (E171).

Numero dell'omologazione

48914 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Carboticon? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e drogheria, senza ricetta medica.

Confezioni di capsule confezionate insieme: 30 capsule blu, 30 capsule rosse.

Titolare dell'omologazione

Leman SKL SA, Lancy.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

