

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

DR. BÄHLER gel consolida, gel

Medicamento fitoterapeutico

Che cos'è DR. BÄHLER gel consolida e quando si usa?

DR. BÄHLER gel consolida è un gel analgesico, inibitore d'infiammazioni, e stimola la guarigione.

L'irrorazione sanguigna deve essere migliorata nelle zone trattate e quindi anche l'ossigenazione nei tessuti. Seconda la tradizione, DR. BÄHLER gel consolida si usa:

- in caso di traumi senza tagli (senza spargimenti di sangue) da sport, sul lavoro e da incidenti: contusioni, distorsioni, stiramenti e mialgie da sforzo.
- per il trattamento di supporto alle malattie reumatiche (dolori articolari e muscolari, artrosi).

Quando non si può usare DR. BÄHLER gel consolida e quando il suo uso richiede prudenza?

Non usi DR. BÄHLER gel consolida: su ferite aperte, in caso d'ipersensibilità accertata ad uno dei principi attivi e sui bambini ed adolescenti.

Se i disturbi non scompaiono entro un periodo di dieci giorni o vanno aggravarsi, consultate il vostro medico.

Questo medicinale contiene 330 mg di alcol (etanolo) per 1g di gel. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare DR. BÄHLER gel consolida durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare DR. BÄHLER gel consolida?

Adulti: Seconda a la dimensione della zona interessata, massaggiare un pezzetto di 2 - 5 cm di DR. BÄHLER gel consolida sulle zone colpite fino a 5 volte al giorno e lasciar asciugare.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

L'uso e la sicurezza di DR. BÄHLER gel consolida nei bambini e negli adolescenti non sono ancora stati sottoposti a verifica.



Quali effetti collaterali può avere DR. BÄHLER gel consolida?

I seguenti effetti collaterali possono verificarsi con l'uso di DR. BÄHLER gel consolida: reazioni allergiche cutanee (eritema, prurito cutaneo). Questi effetti scompaiono alla sospensione del medicamento. Se le reazioni cutanee persistono, consulti il suo medico, farmacista o droghiere.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Conservi il tubetto ben chiuso.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere, possono darle ulteriori informazioni.

DR. BÄHLER gel consolida non contiene grassi, non appiccica e non macchia.

Cosa contiene DR. BÄHLER gel consolida?

1 g di gel contiene:

Principi attivi

350 mg d'estratto liquido da radice fresca di consolida (*Symphytum officinalis* L, radix), rapporto droga/estratto 1:3-4, agente d'estrazione: etanolo 52 % (m/m), 50 mg d'estratto liquido d'erbe fresca d'iperico (*Hypericum perforatum* L, herba), rapporto droga/estratto 1:1,5-2,5, agente d'estrazione: etanolo 86 % (m/m), 50 mg d'estratto liquido d'erbe fresca di calendola (*Calendula officinalis* L., herba), rapporto droga/estratto 1:1,5-2,5, agente d'estrazione: etanolo 86 % (m/m), 25 mg d'estratto liquido d'erbe fresca di menta (*Mentha piperita* L., herba), rapporto droga/estratto 1:1,5-2,5, agente d'estrazione: etanolo 86 % (m/m), 25 mg d'estratto liquido d'erbe fresca di rudbeckia (*Echinacea purpurea* (L.) Moench, herba), rapporto droga/estratto 1:1,5-2,5, agente d'estrazione: etanolo 86 % (m/m).

Sostanze ausiliarie

Acqua, Etanolo (330 mg), carbomeri, diisopropanolamina.

Numero dell'omologazione

60719 (Swissmedic)

Dove è ottenibile DR. BÄHLER gel consolida? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubetti da 100 g.

Titolare dell'omologazione

DR. BÄHLER DROPAG, CH-8045 Zürich



Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

