

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cytotec®

Pfizer AG

Che cos'è Cytotec e quando si usa?

Su prescrizione medica.

Varie malattie e condizioni dolorose dello stomaco possono essere causate da un'eccessiva produzione di acido gastrico o dall'assunzione di medicinali antinfiammatori che indeboliscono i meccanismi di difesa della mucosa gastrica. Cytotec diminuisce la produzione di acido nello stomaco e supporta i meccanismi di difesa della mucosa gastrointestinale, riducendo così i danni allo stomaco o al duodeno provocati dall'eccessiva produzione di acido o dagli antidolorifici.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Durante il trattamento con Cytotec eviti cibi e bevande che possono nuocere allo stomaco. Nel corso del trattamento dovrà anche rinunciare al fumo e al consumo di alcol.

I medicinali a base di magnesio contro l'iperacidità gastrica devono essere evitati.

Quando non si può usare Cytotec?

Dato che Cytotec può causare aborti spontanei, non deve usare il medicamento se è in età fertile e non usa un metodo contraccettivo efficace (spirale, pillola anticoncezionale).

Cytotec non deve essere usato neanche in caso di ipersensibilità al misoprostolo, ad altri ingredienti o alle prostaglandine.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Cytotec?

Se soffre di una malattia dei vasi del cervello o del cuore in cui una diminuzione della pressione arteriosa potrebbe causare gravi complicazioni, dovrà usare Cytotec solo con cautela.

Cytotec non è stato testato in pazienti con funzionalità epatica ridotta.

Durante il trattamento di Cytotec non si può escludere completamente la comparsa di ulcere gastriche e duodenali, anche in assenza di sintomi.

Cytotec non è stato esaminato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni e, pertanto, non deve essere assunto da questi soggetti.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente.

Non si può escludere che Cytotec possa avere effetti sulla capacità di concentrazione, sulla capacità di condurre un veicolo e sull'utilizzo di macchine.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Si può usare Cytotec durante la gravidanza o l'allattamento?

Cytotec non deve essere assunto né durante la gravidanza né durante l'allattamento.



Come usare Cytotec?

Per il trattamento delle ulcere gastriche e duodenali nonché delle ulcere gastriche causate da medicinali antinfiammatori, a condizione che lei debba proseguire il suo trattamento antinfiammatorio in modo continuativo:

- 4 compresse al giorno suddivise in 2 o 4 dosi singole, da assumere ai pasti e prima di coricarsi, per un periodo di 4-8 settimane.

Per la prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali e soltanto qualora soffra di una forma grave di reumatismo infiammatorio che richiede un trattamento continuativo con un medicinale antinfiammatorio:

- 2 compresse al giorno, 1 la mattina e 1 la sera, da assumere ai pasti.

La scanalatura decorativa di Cytotec compresse non è fatta per dividere la compressa.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicinale sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Cytotec?

Con l'assunzione di Cytotec possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Diarrea lieve o moderata. Di norma questi sintomi scompaiono dopo pochi giorni, anche se si prosegue il trattamento.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Dolori alla pancia, nausea, disturbi digestivi, flatulenza, vomito, stitichezza, stordimento mentale e mal di testa.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1'000)

Emorragie vaginali (anche dopo la menopausa), sanguinamenti intermestruali, fastidi e disturbi mestruali, mestruazioni prolungate così come crampi uterini.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10'000)

Diarrea grave con perdita di liquidi.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

Brividi, febbre, gravi reazioni allergiche, eruzione cutanea e sanguinamenti uterini.

Quando Cytotec è stato assunto durante la gravidanza, in singoli casi si sono verificati embolia di liquido amniotico, contrazioni uterine anormali, parto di feto morto, aborto spontaneo incompleto, parto prematuro, mancata espulsione della placenta, lacerazione o perforazione dell'utero così come difetti alla nascita.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicinale non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e fuori della portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.



Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cytotec?

Principi attivi

1 compressa (con scanalatura decorativa) di Cytotec contiene 200 µg di misoprostolo.

Sostanze ausiliarie

Ipromellosa, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico (tipo A), olio di ricino idrogenato.

Numero dell'omologazione

46945 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Cytotec? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezioni da 30 e da 100 compresse (con scanalatura decorativa).

Titolare dell'omologazione

Pfizer AG, Zürich

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

PIL V006

