

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

HepaGel®

Spirig HealthCare AG

Che cos'è HepaGel e quando si usa?

HepaGel è un preparato a base di eparina ad uso esterno con proprietà anticoagulanti ed antinfiammatorie. Il suo principio attivo favorisce la regressione degli ematomi superficiali, per cui diminuisce la tensione dei tessuti e di conseguenza il dolore che ne deriva. Essendo una sostanza presente normalmente nel nostro corpo, l'eparina non provoca irritazioni. La base gelatinosa di HepaGel è delicata per la pelle, si lascia applicare con facilità ed agisce in modo piacevolmente rinfrescante.

HepaGel è adatto al trattamento di disturbi legati alle vene varicose, come i dolori, la sensazione di pesantezza, il gonfiore alle gambe (edema da stasi) e i crampi ai polpacci. HepaGel viene utilizzato inoltre per il trattamento dei traumi chiusi da sport e da incidente, come gli ematomi, le contusioni, gli schiacciamenti, gli stiramenti, i gonfiori, i dolori muscolari e tendinei, per ammorbidire cicatrici di particolare consistenza, per la cura delle cicatrici e per migliorarne l'aspetto estetico. HepaGel viene utilizzato, su prescrizione medica, anche per il trattamento di trombosi o di flebiti superficiali.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Segua i consigli del suo medico oltre a quelli sul dosaggio, p. es. praticare ginnastica o portare calze di sostegno. HepaGel non contiene componenti untuose e non danneggia le calze di sostegno elasticizzate.

Quando non si può usare HepaGel?

In caso di ipersensibilità al principio attivo (eparina) o ad un altro componente di HepaGel. Nel dubbio, se ne può accertare la tollerabilità su una piccola superficie cutanea. In presenza di trombocitopenia nota indotta o associata all'assunzione di eparina (HIT, carenza di piastrine indotta dall'eparina) non si deve applicare HepaGel.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di HepaGel?

HepaGel va applicato solo sulla pelle intatta e non sulle ferite aperte e sulle mucose. Evitare il contatto con gli occhi. *Non frizionare* in caso di malattie venose causate da un coagulo sanguigno (cosiddetta tromboembolia). Si rivolga al medico se i sintomi persistono o addirittura peggiorano.

A causa del contenuto di eparina di HepaGel non si possono escludere totalmente interazioni con medicinali che inibiscono la coagulazione del sangue (appartengono a questa categoria di farmaci, oltre ai medicinali per la fluidificazione del sangue, anche molti analgesici e antinfiammatori). È tuttavia improbabile che si osservi un aumento del rischio di emorragia, dato che, con un uso corretto di HepaGel, l'eparina in esso contenuta praticamente non arriva al circolo sanguigno. In caso di concomitante uso di HepaGel e dei medicinali sopra indicati chiedi consiglio al suo medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!)

Si può usare HepaGel durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche.



Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare HepaGel?

Il preparato viene applicato in strato sottile più volte al giorno sulle parti da trattare e sulle zone circostanti e distribuito delicatamente.

L'uso e la sicurezza di HepaGel nei bambini e negli adolescenti non sono stati ancora esaminati.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere HepaGel?

Reazioni di ipersensibilità ai componenti di HepaGel si riscontrano raramente. In questo caso non si deve più usare il preparato.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene HepaGel?

Principi attivi

1 g di gel contiene 400 U.I. di eparina sodica.

Sostanze ausiliarie

Alcool isopropilico, glicerolo (E 422), fenossietanolo, carbomeri, sodio idrossido, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

38459 (Swissmedic).

Dove è ottenibile HepaGel? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Tubi da 50 g e 100 g.

Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

