

Qu'est-ce que le Gyno-Pevaryl Depot et quand doit-il être utilisé?

Gyno-Pevaryl Depot est une préparation qui détruit les champignons responsables chez l'homme d'infections au niveau des organes génitaux.

Sur prescription médicale, Gyno-Pevaryl Depot est destiné au traitement d'affections dues aux champignons au niveau du vagin.

Gyno-Pevaryl Depot se liquéfie dans le vagin et permet en l'espace d'un jour le traitement d'affections aiguës dues à des champignons.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

La mycose vaginale ne peut être traitée correctement que si vous vous conformez exactement aux instructions de votre médecin.

Les infections, notamment aussi celles du vagin, sont des maladies transmissibles. Veuillez respecter des mesures d'hygiène strictes, telles que des lavages réguliers, pendant toute la durée du traitement.

Les sous-vêtements, les serviettes de toilette et les gants de toilette doivent être changés tous les jours.

Ne perdez pas de vue que ce médicament vous a été prescrit par le médecin pour le traitement de votre maladie actuelle. Il ne doit pas être utilisé pour le traitement d'autres affections.

Quand Gyno-Pevaryl Depot ne doit-il pas être utilisé?

Gyno-Pevaryl Depot est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité au principe actif, à d'autres antifongiques comparables (dérivés de l'imidazole) ou à l'un des excipients.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Gyno-Pevaryl Depot?

Le champignon présent dans le vagin provoque en général des troubles tels que des démangeaisons, une sensation de brûlure et des pertes vaginales. Dans de rares cas, ces manifestations peuvent s'amplifier passagèrement pendant l'utilisation du Gyno-Pevaryl Depot.

Si les irritations persistent, ceci peut être un signe de réactions d'hypersensibilité et une consultation médicale s'impose.

Pour éviter toute rechute, il convient de traiter aussi les lèvres de la vulve et le partenaire.

Gyno-Pevaryl Depot ne doit pas être pris par voie orale.

Il convient d'éviter l'utilisation simultanée de Gyno-Pevaryl Depot et d'un diaphragme ou de préservatifs à titre contraceptif: il pourrait s'ensuivre, d'une part, une altération de la surface du diaphragme et une diminution de la résistance à la déchirure du préservatif et, d'autre part, un affaiblissement de l'efficacité de Gyno-Pevaryl Depot.

Si vous utilisez un contraceptif spermicide (qui tue les spermatozoïdes), parlez-en à votre médecin car un traitement simultané par Gyno-Pevaryl Depot peut rendre ce contraceptif inefficace.

Vous ne devez pas utiliser d'autres médicaments à usage externe en même temps que Gyno-Pevaryl Depot.

Informez votre médecin, si vous prenez en même temps des fluidifiants du sang (anticoagulants) comme l'acénocoumarol (Sintrom®) ou la phénprocoumone (Marcoumar®), parce que Gyno-Pevaryl Depot peut influencer leur effet.

Certaines patientes présentant une réaction d'hypersensibilité à d'autres médicaments contre les mycoses ont également rapporté une sensibilité au nitrate d'éconazole. Informez votre médecin si vous avez déjà présenté une réaction d'hypersensibilité à un médicament contre les mycoses.



Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous utilisez déjà d'autres médicaments (même en automédication!) par voie orale ou vaginale.

Gyno-Pevaryl Depot peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Pendant la grossesse et la période d'allaitement, Gyno-Pevaryl Depot ne doit être utilisé que sur prescription médicale. Il est recommandé de ne pas allaiter pendant l'utilisation de Gyno-Pevaryl Depot.

Comment utiliser Gyno-Pevaryl Depot?

Sauf prescription contraire du médecin, introduire les deux ovules vaginaux le plus profondément possible dans le vagin à 12 heures d'intervalle.

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou, au contraire, trop forte.

Enfants et adolescents

La sécurité et l'efficacité de Gyno-Pevaryl Depot n'ont pas été testées chez les enfants et adolescents.

Quels effets secondaires Gyno-Pevaryl Depot peut-il provoquer?

La prise de Gyno-Pevaryl Depot peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquents: sensation de brûlure de la peau ou démangeaisons au niveau du site d'application.

Occasionnels: éruption cutanée.

Très rares: réactions allergiques avec gonflement de la peau et des muqueuses, urticaire, dermatite de contact et peau qui pèle.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, qui ne sont pas décrits dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

À quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «EXP».

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.

À la fin du traitement, veuillez rapporter les restes éventuels du médicament chez le médecin ou le pharmacien qui vous l'ont délivré, en vue d'une élimination correcte.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Gyno-Pevaryl Depot?

Principe actif: nitrate d'éconazole.

1 ovule vaginal contient 150 mg de nitrate d'éconazole et comme excipients: gomme xanthane, gomme de guar et gomme de caroube, silice colloïdale anhydre, glycérides hémisynthétiques solides, heptanoate de stéaryle, caprylate de stéaryle.

Numéro d'autorisation

44676 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Gyno-Pevaryl Depot? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Emballage à 2 ovules vaginaux.



Titulaire de l'autorisation

Medius AG, 4132 MuttENZ

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2019 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

