

Che cos'è Gyno-Pevaryl Depot e quando si usa?

Il Gyno-Pevaryl Depot è un medicamento che distrugge funghi microscopici che nell'uomo possono provocare infezioni nell'ambito genitale.

Il Gyno-Pevaryl Depot si usa su prescrizione del medico per la terapia di malattie dovute a funghi microscopici («micosi») della vagina e delle parti genitali esterne.

Il Gyno-Pevaryl Depot si liquefa nella vagina e permette di curare infezioni micotiche acute in un giorno.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

La micosi vaginale si può curare correttamente soltanto se lei si attiene esattamente alle prescrizioni del suo medico curante. Le infezioni, anche quelle della vagina, sono malattie trasmissibili. Adotti per favore misure igieniche come quella di lavarsi regolarmente durante il decorso della malattia.

Biancheria intima, asciugamani e guanti da bagno vanno cambiati ogni giorno.

Non dimentichi che questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico per curare la malattia di cui soffre attualmente. Non lo si può usare per curare altre.

Quando non si può usare Gyno-Pevaryl Depot?

Gyno-Pevaryl Depot è controindicato nei pazienti con ipersensibilità verso il principio attivo, altri antimicotici equiparabili (del tipo imidazolico) o verso una delle sostanze ausiliarie.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Gyno-Pevaryl Depot?

In generale i funghi della vagina provocano disturbi quali prurito, bruciore e perdite. In rari casi, durante l'uso del Gyno-Pevaryl Depot i fenomeni di irritazione possono transitoriamente aumentare.

Se le manifestazioni irritative dovessero persistere, ciò potrebbe essere segno di una reazione d'ipersensibilità, e occorrerà consultare il medico.

Per evitare delle ricadute, si consiglia di comprendere nel trattamento anche le labbra vaginali e di sottoporre al trattamento anche il partner.

Gyno-Pevaryl Depot non deve essere assunto per via orale.

Occorre evitare l'uso concomitante di diaframmi o preservativi per la contraccezione con Gyno-Pevaryl Depot, poiché, da una parte, si modificherà la superficie del diaframma e si ridurrà la resistenza alla lacerazione dei preservativi, e dall'altra si potrebbe compromettere l'azione terapeutica di Gyno-Pevaryl Depot.

Se utilizza un contraccettivo spermicida parli con il suo medico, perché un trattamento concomitante con Gyno-Pevaryl Depot potrebbe rendere inefficace il contraccettivo.

L'uso di altri medicinali applicati esternamente insieme con Gyno-Pevaryl Depot andrebbe evitato.

Informi il suo medico se contemporaneamente assume farmaci per diluire il sangue (anticoagulanti), quali l'acenocumarolo (Sintrom®) o il fenprocumone (Marcoumar®), poiché Gyno-Pevaryl Depot potrebbe interferire con l'effetto dell'anticoagulante.

Le pazienti ipersensibili ad altri antimicotici hanno riferito anche ipersensibilità all'econazolo nitrato. Informi il suo medico se ha mai avuto reazioni di ipersensibilità ad un antimicotico.

Informi il medico o il farmacista se soffre di altre malattie, è allergico oppure o prende o adopera per uso vaginale altri medicinali (anche di propria iniziativa!).

Si può usare Gyno-Pevaryl Depot durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza e l'allattamento, Gyno-Pevaryl Depot si può usare soltanto su prescrizione medica. Si raccomanda di non allattare durante la terapia con Gyno-Pevaryl Depot.



Come usare Gyno-Pevaryl Depot?

Salvo diversa prescrizione del suo medico, introduca il più profondamente possibile nella vagina i due ovuli vaginali, a 12 ore d'intervallo.

Non modifichi di sua iniziativa la posologia del medicamento che le è stata prescritta. Se ritiene che il farmaco agisca troppo poco o troppo ne parli al medico o al farmacista.

Bambini ed adolescenti

La sicurezza e l'efficacia di Gyno-Pevaryl Depot nei bambini e negli adolescenti non sono state verificate.

Quali effetti collaterali può avere Gyno-Pevaryl Depot?

Con l'assunzione di Gyno-Pevaryl Depot possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Frequenti: sensazione di bruciore della pelle o prurito nella sede dell'applicazione

Occasional: eruzione cutanea

Molto rari: reazioni allergiche con tumefazione della pelle e delle mucose, orticaria, dermatite da contatto e desquamazione della pelle

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 30 °C.

A cura ultimata riportare l'eventuale residuo di medicamento a chi lo aveva dispensato (medico o farmacista) affinché sia eliminato conformemente alle esigenze.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Gyno-Pevaryl Depot?

Principio attivo: econazolo nitrato.

1 ovulo vaginale contiene 150 mg di econazolo nitrato e, come sostanze ausiliarie, gomma xantana, farina di semi di guar e farina di semi di carruba, biossido di silicio colloidale, olio idrogenato, stearil eptanoato, stearil caprilato.

Numero dell'omologazione

44676 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Gyno-Pevaryl Depot? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro su presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 2 ovuli vaginali.

Titolare dell'omologazione

Medius AG, 4132 MuttENZ

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2019 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

