

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere il medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Farlutal®

Pfizer AG

Che cos'è Farlutal e quando si usa?

Farlutal contiene il principio attivo medrossiprogesterone acetato, un derivato sintetico del progesterone, l'ormone del corpo luteo femminile. Farlutal è impiegato per il trattamento di tumori ormono-dipendenti della mammella, dell'utero e della prostata. Farlutal è impiegato nelle malattie tumorali anche per contrastare il dimagrimento e la perdita di forza.

Su prescrizione medica.

Quando non si può usare Farlutal?

In caso di infiammazione delle vene o altri disturbi con formazione di coaguli di sangue, in seguito a un ictus nonché in caso di malattie con un rischio aumentato per questi disturbi (ad es. arteriosclerosi, disturbi delle valvole cardiache, infiammazioni della parete del cuore, insufficienza cardiaca, disturbi del flusso sanguigno nel cervello), in caso di degenza prolungata a letto a seguito di un'operazione o una malattia, in caso di funzionalità epatica fortemente ridotta, valori eccessivamente alti di calcio nel sangue, durante la gravidanza e l'allattamento, in caso di disturbi mestruali e sanguinamenti vaginali di origine non nota e in caso di ipersensibilità al principio attivo o alle sostanze ausiliarie.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Farlutal?

Poiché durante il trattamento con Farlutal si possono formare dei coaguli di sangue con conseguenti complicazioni, prima di iniziare il trattamento il medico la esaminerà per valutare i fattori di rischio per questo tipo di eventi. Se durante il trattamento con Farlutal manifesta i segni di una formazione di coaguli di sangue come dolore e sensazione di tensione nei polpacci e nelle cosce, improvvisi disturbi alla vista, improvvisa perdita, totale o parziale, della vista o dell'udito, improvvisi disturbi del linguaggio o della percezione, insoliti forti mali di testa o improvvisi attacchi di emicrania, improvvisi disturbi della respirazione o improvvisa comparsa di tosse di origine non chiara, improvviso forte dolore al torace, con o senza irradiazione nel braccio sinistro, deve immediatamente interrompere Farlutal e informare di ciò immediatamente il medico. Il trattamento con Farlutal deve essere interrotto anche prima di un'operazione programmata (ca. 4 settimane) o in caso di una degenza prolungata a letto.

Il trattamento con Farlutal può portare a mestruazioni irregolari o assenza di mestruazioni e può anche mascherare l'inizio della menopausa.

Poiché il principio attivo di Farlutal ha un effetto simile a quello del cortisone, il medico la monitorerà attentamente al riguardo.

Farlutal può influenzare il metabolismo degli zuccheri. Pertanto, se lei è diabetico, il medico la monitorerà attentamente.

Il medico la controllerà in particolar modo anche se soffre di pressione sanguigna elevata, malattie dei reni, malattie cardiache, asma, obesità, accumulo d'acqua nelle gambe e nelle mani (edemi), valori elevati di grassi nel sangue, epilessia, emicrania o depressione.

Inoltre, in determinate circostanze, l'uso prolungato di Farlutal può favorire la comparsa di osteoporosi (riduzione di massa ossea). Pertanto, presti attenzione ad assumere calcio e vitamina D in quantità sufficienti. Se necessario, il medico le prescriverà dei preparati a base di calcio e/o vitamina D.

L'uso prolungato di progestinici, incluso Farlutal, è stato associato allo sviluppo di meningiomi, tumori generalmente benigni delle meningi. Il rischio risulta aumentato soprattutto se il medicamento viene usato



per un periodo prolungato (diversi anni).

Se le viene diagnosticato un meningioma, il suo medico riconsidererà il trattamento con Farlital.

Se manifesta sintomi che possono indicare la presenza di un meningioma, informi immediatamente il suo medico. Tali sintomi sono ad es. crescente mal di testa, disturbi visivi, riduzione dell'udito o ronzio nelle orecchie, perdita del senso del gusto, perdita della memoria, debolezza delle braccia o delle gambe e convulsioni. Informi il suo medico se ha un meningioma o lo ha avuto in passato.

Reazioni da ipersensibilità ai componenti:

Le compresse di Farlital contengono lattosio. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere Farlital.

Interazioni con altri medicinali:

L'assunzione contemporanea di determinati altri medicinali può compromettere l'efficacia di Farlital. Tra questi medicinali figurano ad es. alcuni medicinali per il trattamento dell'epilessia, di malattie infettive (antibiotici), medicinali per il trattamento delle infezioni da HIV o di malattie tumorali (aminoglutetimide) così come preparati a base di erba di San Giovanni. In caso di uso contemporaneo di Farlital con medicinali antinfiammatori (antireumatici) o con medicinali vasodilatatori potrebbe verificarsi un maggiore accumulo d'acqua nel corpo. Pertanto, informi il suo medico se assume altri medicinali.

Effetti sulla capacità di condurre veicoli e sull'impiego di macchine:

Poiché durante l'uso di Farlital possono manifestarsi capogiri, confusione e difficoltà di concentrazione, è richiesta prudenza quando si guidano veicoli o si utilizzano macchine.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Farlital durante la gravidanza o l'allattamento?

Farlital non deve essere assunto né durante la gravidanza né durante l'allattamento. Si rivolga immediatamente al suo medico se sta programmando una gravidanza o se è incinta.

Come usare Farlital?

Il dosaggio dipende dalla malattia e varia generalmente tra i 500 mg (1 compressa) e i 1'500 mg (3 compresse) al giorno. In caso di tumore della prostata il dosaggio è di 1'500-2'000 mg (3-4 compresse) 3 volte a settimana.

Segua attentamente le indicazioni del medico.

Le compresse vanno assunte dopo un pasto.

La dose giornaliera può essere suddivisa in 1-3 dosi.

Le compresse vanno ingerite con un po' di liquido senza masticarle e devono essere assunte in posizione seduta o eretta.

Le compresse presentano una scanalatura decorativa, ma non devono essere divise.

Farlital non è destinato all'uso nei bambini e negli adolescenti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Farlital?

Con l'assunzione di Farlital possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)



Fluttuazione del peso, appetito aumentato, insonnia, mal di testa, vertigine, tremore, nausea, stitichezza, vomito, forte sudorazione, disfunzione erettile, accumulo di liquidi (edemi), stanchezza.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1'000)

Angioedema (gonfiore della pelle e delle mucose), segni di un effetto simile a quello del cortisone («faccia a luna piena», aumento di peso), aggravamento di un diabete mellito, depressione, euforia, alterazioni della libido, insufficienza cardiaca, infiammazione delle vene con formazione di coaguli di sangue (dolore e sensazione di tensione nei polpacci o nelle cosce), embolia polmonare, diarrea, bocca secca, acne, aumento dei peli corporei, tensioni muscolari, disturbi mestruali (sanguinamento irregolare, più intenso, ridotto, debole), dolore mammario.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

Ipersensibilità a farmaci, nervosismo, sonnolenza, ictus, infarto miocardico, aumento della pressione sanguigna, occlusione dei vasi sanguigni (embolia e trombosi), eruzione cutanea, perdita di capelli, malessere, febbre.

Frequenza non nota

Reazioni allergiche (eventualmente con difficoltà respiratorie, abbassamento della pressione sanguigna), assenza prolungata di ovulazione, confusione, perdita di concentrazione, peggioramento della vista, cataratta nei diabetici, occlusione dei vasi sanguigni oculari, palpitazioni, tachicardia, disturbi gastrici, ingiallimento della pelle (ittero), prurito, orticaria, assenza di mestruazioni, sensazione di tensione al seno, alterazioni delle secrezioni vaginali, fuoriuscita di latte, tumore cerebrale (meningioma)*.

*Segnalazioni successive all'introduzione sul mercato

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Istruzioni di conservazione

Conservare Farlutal compresse a temperatura ambiente (15-25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Se è in possesso di confezioni scadute, le riporti in farmacia affinché vengano eliminate.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Farlutal?

Compresa bianca, oblunga con impresso «FCE 500» e scanalatura decorativa.

Principi attivi

1 compressa di Farlutal contiene 500 mg di medrossiprogesterone acetato.

Sostanze ausiliarie

Lattosio, crosopovidone, povidone K25, polisorbato 80 (prodotto da mais geneticamente modificato), cellulosa microcristallina, magnesio stearato.

Numero dell'omologazione



44307 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Farlutal? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

60 compresse di Farlutal (con scanalatura decorativa) da 500 mg.

Titolare dell'omologazione

Pfizer AG, Zürich.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'aprile 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

PIL V019

