

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pefrakehl D5, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Pefrakehl D5, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Pefrakehl D5, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso d'affezione micotiche della pelle e delle mucose.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Pefrakehl D5, gocce.

Quando non si può assumere Pefrakehl D5, gocce e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

. Non deve essere utilizzato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni. Non sono necessarie precauzioni particolari, a condizione che il preparato sia usato correttamente. Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa).

Si può assumere Pefrakehl D5, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Pefrakehl D5, gocce?

Salvo diversa prescrizione medica negli adulti:

Da prendere: 8 gocce 1 volta al giorno prima di un pasto.

Per inalazioni: 10 – 20 respirazioni profonde 2 – 3 volte al giorno.

Da frizionare: a) 5 – 10 gocce sulla zona colpita o al di sopra del gomito, 1 volta al giorno. b) durante il trattamento con iniezioni: frizionare 5 – 10 gocce 2 volte alla settimana ai giorni senza iniezione. L'uso e la sicurezza del Pefrakehl D5, gocce nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Pefrakehl D5, gocce?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Pefrakehl D5, gocce. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Pefrakehl D5, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con "Verwendbar bis" sulla confezione. Conservare il medicamento fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Pefrakehl D5, gocce?

1 mL di soluzione contiene:

1 mL Candida parapsilosis D5 aquos. dilutio secondo prescrizione 5a HAB.

Numero dell'omologazione

50298 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Pefrakehl D5, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Confezione da 10 mL.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

