

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament.

Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Serevent Diskus (inhalateur pulvérisant multidoseur)

GlaxoSmithKline AG

Qu'est-ce que Serevent Diskus et quand doit-il être utilisé?

Serevent Diskus combat les spasmes de la musculature bronchique qui surviennent en cas d'asthme ou d'autres affections des bronches. Grâce à l'inhalation, le principe actif produit son effet directement dans les poumons.

Serevent Diskus est un traitement de longue durée et ne doit être utilisé que selon prescription du médecin.

Dans le traitement de l'asthme bronchique, Serevent ne devrait pas être utilisé comme seul traitement, mais devrait toujours être associé à un traitement de fond anti-inflammatoire (en général des corticostéroïdes pour inhalation).

Quand Serevent Diskus ne doit-il pas être utilisé?

Serevent Diskus ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants (salmétérol, lactose, protéines du lait).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Serevent Diskus?

Serevent Diskus n'est pas indiqué pour le traitement d'une crise d'asthme aiguë.

Veuillez respecter le point suivant dans le traitement de difficultés respiratoires d'apparition subite ou s'aggravant rapidement: si des inhalations supplémentaires d'un β_2 -stimulant à effet rapide et à courte durée d'action (p.ex. Ventolin) n'améliorent pas nettement vos difficultés respiratoires, vous ne devez pas hésiter à consulter un médecin ou l'hôpital le plus proche.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d'utiliser Serevent Diskus.

Lors d'une administration simultanée de Serevent avec d'autres médicaments, leurs effets peuvent s'influencer mutuellement. Il s'agit, par exemple, des médicaments destinés au traitement des dépressions, de la maladie de Parkinson, des affections thyroïdiennes et de certaines maladies cardiaques, ainsi que des médicaments pris par voie orale pour le traitement d'infections provoquées par des champignons et contenant le principe actif kétoconazole, et certains médicaments antiviraux. Votre médecin connaît les précautions qu'il vous faut observer si vous devez prendre un ou plusieurs de ces médicaments conjointement avec Serevent.

L'influence de Serevent sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines n'a pas fait l'objet d'études spécifiques, mais sa diminution n'est guère probable.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie (hyperfonctionnement de la thyroïde, problèmes cardiaques, hypertension, diabète sucré, affections hépatiques),
- vous êtes allergique
- vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Serevent Diskus peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, ou souhaitez le devenir, ou si vous allaitez votre enfant, vous ne devriez inhaler Serevent Diskus qu'après en avoir parlé à votre médecin.



Comment utiliser Serevent Diskus?

Serevent Diskus doit être utilisé régulièrement, car l'action se développe progressivement.

Si vous devez inhaler un autre médicament antiasthmatique, veillez à ne pas confondre les différents médicaments.

Directives posologiques:


Adultes: 1 dose unitaire 2 fois par jour, dans les cas graves, 2 doses unitaires 2 fois par jour.

Enfants de 4 ans et plus: 1 dose unitaire 2 fois par jour.

Enfants de moins de 4 ans: Serevent Diskus ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 4 ans, car l'expérience est encore insuffisante.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Mode d'emploi:



Lorsque vous sortez votre Diskus de son emballage, il est en position «fermée».

Le Diskus, non utilisé, contient 60 doses de votre médicament.

Les doses unitaires sous forme de poudre sont mesurées avec précision et présentées sous emballage hygiénique.

Vous pouvez lire le nombre de doses restantes sur l'indicateur de doses.

Les chiffres de 5 à 0 sont marqués en rouge, pour attirer votre attention sur le fait qu'il ne vous reste que quelques doses.

En poussant la manette de votre appareil, vous libérez un orifice dans l'embout buccal, au travers duquel vous pouvez alors inhaler la dose de poudre.



1. Ouvrir (Fig. 1)


Pour ouvrir le Diskus, tenez le boîtier externe d'une main (avec l'indicateur de doses dirigé vers le haut) et placez le pouce de l'autre main sur le cran. Déplacez votre pouce le plus loin possible vers l'arrière (jusqu'au déclic).





2. «Charger» (Fig. 2)

Tenez le Diskus en dirigeant l'embout buccal vers vous. Poussez la manette le plus loin possible vers l'arrière jusqu'au déclic. Votre Diskus est alors prêt pour l'inhalation.



3. Inhaler (Fig. 3)

Avant de commencer l'inhalation, veuillez lire attentivement ces instructions.

- Tenez le Diskus éloigné de votre bouche. Expirez le plus profondément possible.

Important: n'expirez jamais *dans* votre Diskus.

- Appliquez l'embout buccal entre vos lèvres. Inspirez régulièrement et profondément à *travers* le Diskus et non par le nez.
- Retirez le Diskus de votre bouche.
- Retenez votre respiration pendant 10 secondes environ, ou aussi longtemps que vous le pouvez.
- Expirez lentement.

Il est possible que vous ne sentiez aucun goût ni aucune poudre sur la langue même si vous utilisez correctement le Diskus.



4. Fermer (Fig. 4)

Pour refermer votre Diskus, placez votre pouce sur le cran et ramenez le pouce vers vous autant que possible.

Lorsque vous refermez l'appareil, il se produit un déclic. La manette retourne automatiquement dans sa position initiale.

Votre Diskus est alors prêt pour une nouvelle inhalation.

Important: refermez le Diskus lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'actionnez pas inutilement la manette de l'appareil, car chaque «mouvement de chargement» libère une dose.

Si votre médecin vous a prescrit une 2^e inhalation, vous devez refermer le Diskus et répéter les étapes 1 à 4.

Quels effets secondaires Serevent Diskus peut-il provoquer?

L'utilisation de Serevent Diskus peut provoquer les effets secondaires suivants:



Fréquemment, des tremblements légers (notamment au niveau des mains), des maux de tête, des palpitations, une augmentation de la pression artérielle, une agitation, des crampes musculaires ou occasionnellement, une sécheresse de la bouche et une accélération du pouls risquent d'apparaître pendant le traitement. Ces troubles disparaissent normalement lors de la poursuite du traitement. Parlez-en à votre médecin, mais n'arrêtez jamais la thérapie sans son accord.

De même, des réactions d'hypersensibilité (enflures, rougeurs, démangeaisons), des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des irritations de la muqueuse de la bouche et du pharynx et dans des cas isolés, des troubles du rythme cardiaque (extrasystoles, particulièrement chez les personnes sujettes à ces troubles) ont été rapportés. Une augmentation du taux de sucre dans le sang peut également être observée.

Si un gonflement des paupières, du visage ou des lèvres ou des éruptions cutanées apparaissent, vous devez immédiatement en informer votre médecin. Vous devez également immédiatement informer votre médecin si vous ressentez une difficulté respiratoire *soudaine* peu après l'utilisation de Serevent Diskus.

En cas de surdosage, il vous faut immédiatement consulter un médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Remarques concernant le stockage

Serevent Diskus ne doit pas être conservé au-dessus de 30°C et doit être conservé à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Serevent Diskus?

Principes actifs

Salmétérol (50 µg par dose).

Excipients

Lactose (contient des protéines de lait).

Numéro d'autorisation

53021 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Serevent Diskus? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Serevent Diskus, inhalateur pulvérulent multidoseur à 60 doses unitaires.

Titulaire de l'autorisation

GlaxoSmithKline AG, 6340 Baar

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

