

## **Informazione destinata ai pazienti**

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

## **Myrtaven®**

**IBSA Institut Biochimique SA**

### ***Che cos'è Myrtaven e quando si usa?***

Myrtaven è un medicamento ad azione vasoprotettrice. Contiene come principio attivo un insieme di sostanze (antocianosidi) estratte dal mirtillo nero, con proprietà toniche e protettici sui vasi sanguigni. Myrtaven può essere utilizzato nel trattamento di diverse affezioni dei vasi sanguigni: fragilità dei capillari, malattie venose (flebiti, varici etc.), emorroidi.

In oftalmologia: disturbi della circolazione sanguigna a livello della retina, difficoltà della messa a fuoco notturna (emeralopia).

### ***Quando non si può usare Myrtaven?***

Myrtaven non deve essere utilizzato in caso di allergia al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

Myrtaven non è indicato per bambini o adolescenti di meno di 18 anni.

### ***Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Myrtaven?***

Se usato correttamente, non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume o applica (medicamento per uso esterno) altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

### ***Si può usare Myrtaven durante la gravidanza o l'allattamento?***

Durante la gravidanza Myrtaven deve essere somministrato solo su espressa autorizzazione del medico.

### ***Come usare Myrtaven?***

Salva diversa prescrizione del medico, la posologia abituale per adulti è di 1 capsula 2 volte al giorno.

In patologie a lungo decorso, il trattamento con Myrtaven deve essere continuato per diversi mesi sotto controllo medico.

Myrtaven può essere preso prima, durante o dopo i pasti, con un po' di liquido. Ai pazienti con stomaco sensibile è consigliata la presa dopo i pasti. Le capsule devono essere ingerite senza essere masticate.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

### ***Bambini e adolescenti***

L'uso e la sicurezza nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

### ***Quali effetti collaterali può avere Myrtaven?***

Con l'assunzione di Myrtaven possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: occasionalmente possono manifestarsi disturbi gastro-intestinali o un leggero senso di nausea, che generalmente non richiedono l'interruzione del trattamento.

Se si manifesta un'allergia con eruzione cutanea e prurito, sospenda la presa del medicamento e consulti il medico.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

### ***Di che altro occorre tener conto?***



Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Il medicamento deve essere conservato a temperatura ambiente (15–25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.

Se possiede dei medicinali scaduti, li riconsegna al farmacista.

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Il medico o il farmacista che sono in possesso di documentazione professionale possono darle ulteriori informazioni.

### ***Che cosa contiene Myrtaven?***

*Principi attivi:* antocianosidi estratti dal vaccinium myrtillus (mirtillo nero) 58 mg.

*Eccipienti:* q.s. per capsula.

### ***Numero dell'omologazione***

49506 (Swissmedic).

### ***Dove è ottenibile Myrtaven? Quali confezioni sono disponibili?***

Myrtaven è ottenibile in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

E' disponibile nella seguente confezione: 60 capsule.

### ***Titolare dell'omologazione***

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano.

**Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2007 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).**

