

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di far uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Questo medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Cuprukehl® D3, gocce

Medicamento omeopatico

Quando si usa Cuprukehl® D3, gocce?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici Cuprukehl® D3, gocce può essere usato su prescrizione del suo medico in caso di processi infiammatori dello stomaco, dell'intestino e dei reni.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Cuprukehl® D3, gocce.

Quando non si può usare Cuprukehl® D3, gocce e quando il suo uso richiede prudenza?

I bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni non devono prendere Cuprukehl® D3, gocce (alcool). Informi il suo medico o il suo farmacista se

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di propria iniziativa). Questo preparato contiene 20 % vol. d'alcool.

Si può usare Cuprukehl® D3, gocce durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora stati eseguiti studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare Cuprukehl® D3, gocce?

Negli adulti : Salvo diversa prescrizione medica: Casi acuti: Prendere ogni mezza ora o ogni ora 5 gocce. Casi cronici: Prendere 1-3 volte al giorno 5-10 gocce. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. L'uso e la sicurezza dell Cuprukehl® D3, gocce nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni finora non sono stati esaminati. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Cuprukehl® D3, gocce?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Cuprukehl® D3, gocce. Se ciononostante osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista. Con



l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Cuprukehl® D3, gocce e informi il suo medico o il suo farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale non deve essere utilizzato oltre la data indicata con „verwendbar bis“ sulla confezione. Conservare il medicinale fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (max. 25 °C). Il medico, il farmacista possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Cuprukehl® D3, gocce?

1 mL di soluzione contiene:

80 µL gluconato di rame D3 dilutio (HAB; 5a), etanolo come sostanza ausiliaria, corrispondente a 20 % vol. d'alcool.

Numero dell'omologazione

50241 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Cuprukehl® D3, gocce? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia dietro presentazione della prescrizione medica.

Flaconi contagocce da 30 mL e 100 mL.

Titolare dell'omologazione

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2004 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

