

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Duspatalin® Retard

Viatrix Pharma GmbH

Che cos'è Duspatalin retard e quando si usa?

Duspatalin retard è un farmaco che elimina gli stati spastici del tratto digestivo. E' dotato di un'azione rilassante sulla muscolatura liscia del tratto gastro-intestinale e delle vie biliari. La normale attività dell'intestino viene influenzata minimamente.

Su prescrizione medica.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Durante il trattamento con Duspatalin retard non occorre prendere in considerazione misure speciali.

Quando non si può assumere Duspatalin retard?

- Ipersensibilità ad uno dei costituenti del medicamento;
- in caso di occlusione intestinale (ileo paralitico).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Duspatalin retard?

Duspatalin retard non è suggerito per i bambini e gli adolescenti inferiori ai 18 anni, poiché i dati su sicurezza e su efficacia sono insufficienti.

Parla con il suo medico se soffre attualmente o ha sofferto in passato di disturbi del fegato e/o dei reni.

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere Duspatalin retard durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza è opportuno che la paziente segua esattamente le prescrizioni del suo medico curante.

Duspatalin retard non deve essere assunto durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Duspatalin retard?

Adulti

2 capsule al giorno, preferibilmente 1 al mattino e 1 alla sera.

Le capsule devono essere deglutite intere con un abbondante bicchiere d'acqua (almeno 100 ml).

Se ha dimenticato una o più volte di assumere le capsule, prosegua l'assunzione secondo prescrizione. Non assuma le dosi dimenticate in aggiunta alla dose regolare.

Bambini ed adolescenti inferiori ai 18 anni

Duspatalin retard non è suggerito per i bambini e gli adolescenti inferiori ai 18 anni, poiché i dati su sicurezza e su efficacia sono insufficienti.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.



Quali effetti collaterali può avere Duspatalin retard?

In seguito all'assunzione di Duspatalin retard possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Sono state osservate casi di ipersensibilità, reazioni allergiche come eruzioni cutanee, gonfiori della pelle al livello del viso e del collo (per es. angioedema).

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Duspatalin retard?

1 capsula rigida a rilascio prolungato di Duspatalin retard contiene:

Principi attivi

200 mg di mebeverina cloridrato.

Sostanze ausiliarie

Magnesio stearato, acido etilacrilico – metile metacrilato copolimero (1:1), talco, ipromellosa, acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1), triacetina, titanio diossido (E 171), gelatina, gomma lacca, glicole propilenico, ammoniaca soluzione concentrata, potassio idrossido, ossido di ferro nero (E 172).

Numero dell'omologazione

47'639 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Duspatalin retard? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Duspatalin retard 200 mg: confezioni da 30 e 60 capsule.

Titolare dell'omologazione

Viatrix Pharma GmbH, 6312 Steinhausen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

