

Was ist Multilind Heilpaste und wann wird es angewendet?

Multilind Heilpaste ist ein Arzneimittel zur Behandlung von bestimmten Pilzinfektionen (Soor/Candida) der Haut. Es wirkt pilzabtötend und deckt die wunden Hautstellen ab. Multilind Heilpaste wird auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet bei Soor-Pilzinfektionen der Haut und des Nagelfalzes und bei Windeldermatitis.

Wann darf Multilind Heilpaste nicht angewendet werden?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe von Multilind Heilpaste darf das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Wann ist bei der Anwendung von Multilind Heilpaste Vorsicht geboten?

Hinweis bei Anwendung im Genital- oder Rektalbereich

Bei gleichzeitiger Anwendung von Multilind Heilpaste und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reissfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie an anderen Krankheiten leiden, Allergien haben oder andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Darf Multilind Heilpaste während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Multilind Heilpaste kann während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden, wenn von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin ausdrücklich verordnet.

Wie verwenden Sie Multilind Heilpaste?

Soweit nicht anders verordnet, gelten folgende Empfehlungen:

Multilind Heilpaste 2–3 mal täglich, bei Säuglingen nach jedem Wickeln bis maximal 5 mal täglich, auf die erkrankten Hautpartien auftragen.

Setzen Sie die Behandlung bis zur vollständigen Abheilung der Hauterkrankung fort.

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen kann Multilind Heilpaste haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Multilind Heilpaste auftreten:

In seltenen Fällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen oder allergische Reaktionen gegen Bestandteile von Multilind Heilpaste möglich. Selten wurden Hautausschlag, Juckreiz beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Multilind Heilpaste soll bei Raumtemperatur (15–25 °C) und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.



Was ist in Multilind Heilpaste enthalten?

1 g Multilind Heilpaste enthält:

Wirkstoffe: 100'000 Einheiten Nystatin und 200 mg Zinkoxid.

Hilfsstoffe: Hilfsstoffe.

Zulassungsnummer

42675 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Multilind Heilpaste? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Multilind Heilpaste: Tuben mit 20 g und 50 g.

Zulassungsinhaberin

Dermapharm AG, Hünenberg.

Diese Packungsbeilage wurde im Mai 2022 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

