

Qu'est-ce que Multilind Pâte curative et quand doit-il être utilisé?

Multilind Pâte curative est un médicament destiné au traitement des infections de la peau provoquées par un champignon précis (muguet/candidoses). Il agit en tuant les champignons et en recouvrant les plaies de la peau.

Multilind Pâte curative s'utilise sur prescription du médecin lors d'infections dues au champignon du muguet, localisées au niveau de la peau et du lit de l'ongle ainsi que lors d'érythème fessier du nourrisson.

Quand Multilind Pâte curative ne doit-il pas être pris/utilisé?

Multilind Pâte curative ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité avérée à l'un des composants du médicament.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Multilind Pâte curative?

Remarque pour l'utilisation dans la sphère anogénitale

L'utilisation concomitante de Multilind Pâte curative et de préservatifs peut diminuer la résistance à la déchirure de ces derniers et limiter la sécurité des préservatifs.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie ou vous êtes allergique ou vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Multilind Pâte curative peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Multilind Pâte curative peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement uniquement sur prescription formelle du médecin.

Comment utiliser Multilind Pâte curative?

Sauf prescription contraire, les recommandations suivantes sont valables:

Appliquer Multilind Pâte curative 2–3 fois par jour sur les zones cutanées affectées, chez le nourrisson après chaque changement de couches jusqu'à un maximum de 5 fois par jour.

Poursuivez le traitement jusqu'à guérison complète de la maladie cutanée.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Multilind Pâte curative peut-il provoquer?

L'utilisation de Multilind Pâte curative peut provoquer les effets secondaires suivants:

Dans des rares cas, des réactions d'hypersensibilité ou des réactions allergiques aux composants de Multilind Pâte curative sont possibles. Une éruption cutanée, un démangeaison ont été rarement observés.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver Multilind Pâte curative à température ambiante (15–25 °C) et hors de la portée des enfants.

Le médicament peut être conservé 6 mois après ouverture du tube.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Multilind Pâte curative?

1 g de Multilind Pâte curative contient:



Principes actifs: 100'000 unités de nystatine; 200 mg d'oxyde de zinc.

Excipients: excipients.

Numéro d'autorisation

42675 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Multilind Pâte curative? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Multilind Pâte curative: tubes de 20 g et 50 g.

Titulaire de l'autorisation

Dermapharm SA, Hünenberg.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

