

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Arnigel® Boiron, gel

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Arnigel Boiron?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicamenti omeopatici, Arnigel Boiron può essere usato localmente in caso di traumi locali, gonfiori dovuti a colpi, ecchimosi, contusioni, stanchezza muscolare e dolori muscolari da sforzo.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare Arnigel Boiron.

Quando non si può usare Arnigel Boiron e quando il suo uso richiede prudenza?

Arnigel Boiron non può essere usato in caso di ferite aperte. Evitare il contatto con gli occhi (contiene alcool). Arnigel Boiron non può essere usato in caso di ipersensibilità alle asteracee (arnica).

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicamenti o li applichi esternamente (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può usare Arnigel Boiron durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare Arnigel Boiron?

Salvo diversa prescrizione medica:

- Applicare uno strato sottile sulla regione dolente, massaggiando leggermente fino a completa penetrazione.
- Ripetere l'applicazione 2 o 3 volte al giorno.

Uso esterno.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Arnigel Boiron?



In seguito all'applicazione di Arnigel Boiron, possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: reazioni allergiche (arrossamenti o irritazioni della pelle). In tal caso interrompere l'uso del gel.

Se osservasse effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se dovesse trattarsi di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Arnigel Boiron e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Cosa contiene Arnigel Boiron?

Principi attivi

Arnica montana TM 70 mg per 1 g di gel.

Sostanze ausiliarie

Idrossido di sodio, carbomero 980, alcool, acqua.

Numero dell'omologazione

55839 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Arnigel Boiron? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA, CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

BOIRON SA, Francia.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

