Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

ASS Cardio Sandoz®

Sandoz Pharmaceuticals AG

Qu'est-ce que l' ASS Cardio Sandoz et quand doit-il être utilisé?

ASS Cardio Sandoz contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, dès l'administration de faibles quantités, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage gastrorésistant, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison qu' ASS Cardio Sandoz ménage la muqueuse gastrique.

ASS Cardio Sandoz doit être pris uniquement sur prescription du médecin.

ASS Cardio Sandoz est indiqué pour:

- la prévention des thromboses artérielles après des interventions chirurgicales des artères coronaires (pontage et suppression d'une sténose des artères coronaires)
- la prévention des attaques cérébrales, suite à l'apparition de signes précurseurs (accidents ischémiques transitoires, AIT)
- la prévention des thromboses artérielles (caillots sanguins dans les artères coronaires) suite à un infarctus (prophylaxie secondaire de l'infarctus)
- la prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé. Les affections concomitantes telles qu'hypertension artérielle, diabète sucré, taux de lipides sanguins élevés doivent également être traitées. De plus, il faut arrêter de fumer
- le traitement de l'angine de poitrine instable
- le traitement de l'infarctus du myocarde aigu
- la prévention des thromboses artérielles après des interventions chirurgicales des vaisseaux sanguins
- la prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

ASS Cardio Sandoz ne doit pas être utilisé de façon prolongée ou à des doses élevées sans avis médical.

Quand ASS Cardio Sandoz ne doit-il pas être pris?

Vous ne devez pas utiliser ASS Cardio Sandoz dans les circonstances suivantes:

- si vous présentez une réaction allergique à l'un des composants de ce médicament ou si vous avez présenté des difficultés respiratoires ou des réactions cutanées de type allergique après la prise d'acide acétylsalicylique ou d'autres antalgiques ou antirhumatismaux appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens;
- en cas d'ulcère de l'estomac et/ou du duodénum ou de saignements gastro-intestinaux;
- en cas de maladies intestinales chroniques inflammatoires (maladie de Crohn, colite ulcéreuse;
- si vous présentez une tendance anormale aux saignements;
- en cas d'altération sévère de la fonction rénale ou hépatique;
- en cas d'insuffisance cardiaque sévère;

- si vous prenez en même temps du méthotrexate à une dose supérieure à 15 mg par semaine;
- au cours du dernier trimestre de la grossesse;
- en cas de traitement de douleurs postopératoires après un pontage coronarien (ou utilisation d'une machine cœur-poumon).

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise d' ASS Cardio Sandoz?

Pendant le traitement par ASS Cardio Sandoz, des ulcères des muqueuses du tractus digestif supérieur, plus rarement, des saignements ou, dans des cas isolés, des perforations gastro-intestinales peuvent survenir. Ces complications peuvent apparaître à tout moment au cours du traitement et sans symptômes précurseurs. Pour réduire ce risque, votre médecin vous a prescrit la dose efficace la plus faible pendant une durée de traitement aussi courte que possible. Consultez votre médecin si vous présentez des douleurs à l'estomac et pensez qu'elles sont liées à la prise du médicament.

La prise d'ASS Cardio Sandoz peut altérer la fonction rénale, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression artérielle et/ou une rétention hydrique (œdèmes). Informez votre médecin si vous êtes cardiaque, si vous souffrez de troubles rénaux, si vous prenez des médicaments contre l'hypertension artérielle (p.ex. diurétiques, inhibiteurs de l'ECA) ou en cas de pertes hydriques importantes, p.ex. du fait de fortes sudations.

La prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), dont fait aussi partie ASS Cardio Sandoz, peut occasionner une réaction allergique potentiellement sévère, appelée syndrome de Kounis. En plus de réactions allergiques (comme des éruptions cutanées ou un essoufflement), le syndrome de Kounis peut se manifester sous la forme de douleurs thoraciques

En cas d'asthme, d'urticaire, de polypes du nez, de rhume des foins ou d'autres allergies, d'une maladie héréditaire rare des globules rouges du sang appelée «déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase», de même que lors d'un traitement par des médicaments anticoagulants («fluidifiants sanguins», empêchant la coagulation) ou des médicaments abaissant la pression artérielle (antihypertenseurs), vous ne devez prendre ASS Cardio Sandoz que selon les indications strictes du médecin.

ASS Cardio Sandoz n'est pas recommandé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans.

Les enfants et adolescents présentant une fièvre, une grippe, une varicelle ou d'autres infections virales ne doivent prendre ASS Cardio Sandoz que sur prescription médicale et en traitement de deuxième intention. Si au cours de ces maladies ou après leur disparition, des troubles de la conscience associés à des vomissements apparaissent, il convient de consulter immédiatement un médecin.

La prise concomitante d'ASS Cardio Sandoz et d'antidiabétiques (p.ex. insuline, sulfonylurées) peut diminuer le taux de glucose sanguin.

Vous devez consulter votre médecin si vous prenez en même temps qu'ASS Cardio Sandoz un médicament antalgique et anti-inflammatoire (par exemple l'ibuprofène ou le naproxène), car ces principes actifs peuvent réduire l'effet d' ASS Cardio Sandoz.

Le métamizole (substance qui diminue la douleur et la fièvre) peut réduire l'effet de l'acide acétylsalicylique sur l'agrégation plaquettaire (adhérence des cellules sanguines entre elles et formation d'un caillot sanguin), lorsqu'il est pris en même temps. Par conséquent, cette association doit être utilisée avec prudence chez les patients prenant de l'acide acétylsalicylique à faible dose pour la cardioprotection.

L'effet des médicaments contre la goutte (probénécide et sulfinpyrazone), des médicaments augmentant la production d'urine (diurétiques) et des agents antihypertenseurs peut être diminué. L'utilisation d'antirhumatismaux ou de méthotrexate (p.ex. en cas de polyarthrite chronique, voir également rubrique «Quand ASS Cardio Sandoz ne doit-il pas être pris?») peut éventuellement entraîner un renforcement des effets indésirables.

En cas de prise concomitante et prolongée d'ASS Cardio Sandoz, l'effet des préparations à base de cortisone, des agents anticonvulsivants (antiépileptiques), des anticoagulants, de la digoxine et des préparations à base de lithium contre la dépression peut être renforcée. Une augmentation des effets indésirables de ces médicaments peut survenir.

Pris en même temps que des produits à base de cortisone, l'alcool ou des médicaments appartenant au groupe des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine contre les dépressions, ASS Cardio Sandoz peut augmenter le risque de saignements. La prise concomitante d'ASS Cardio Sandoz et de préparations à base de cortisone ou d'alcool peut augmenter le risque d'ulcères gastro-intestinaux.

La tendance hémorragique peut être augmentée également après de petites interventions, par exemple des extractions dentaires.

Même à faibles doses, l'acide acétylsalicylique diminue l'excrétion d'acide urique. Cela peut déclencher une crise de goutte chez des patients dont l'excrétion d'acide urique est déjà réduite.

Ce médicament contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c.-à-d. qu'il est essentiellement «sans sodium».

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Interrogez ou informez votre médecin ou votre dentiste sur la prise d'ASS Cardio Sandoz avant des interventions chirurgicales ou dentaires.

ASS Cardio Sandoz peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

Grossesse

Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou si vous planifiez une grossesse, ne prenez ASS Cardio Sandoz qu'après avoir consulté votre médecin. Si vous devez poursuivre ou commencer un traitement par ASS Cardio Sandoz au cours d'une grossesse, sur prescription du médecin, suivez strictement ses indications et prenez ce traitement uniquement pendant les 6 premiers mois de la grossesse. Vous ne devez pas prendre ASS Cardio Sandoz au cours du dernier trimestre de la grossesse en raison du risque potentiel pour l'enfant à naître, du risque de saignements et d'un éventuel dépassement du terme. Si vous prenez ASS Cardio Sandoz à partir de la 20e semaine de grossesse, le rétrécissement d'un vaisseau sanguin (Ductus arteriosus) dans le cœur de votre enfant peut survenir. S'il est nécessaire que vous preniez ASS Cardio Sandoz, votre médecin peut recommander une surveillance supplémentaire.

Allaitement

ASS Cardio Sandoz ne doit pas être pris pendant l'allaitement, sauf autorisation expresse de votre médecin.

Comment utiliser ASS Cardio Sandoz?

Sauf prescription contraire du médecin:

Prévention des thromboses artérielles sans pontage des artères coronaires et après dilatation (par ballonnet) des artères coronaires rétrécies:

100 mg/jour.

Prévention des thromboses artérielles après pontage des artères coronaires et après dilatation (par ballonnet) des artères coronaires rétrécies:

100–300 mg/jour.

Prévention des attaques cérébrales:

100 mg 3 fois par jour.

Prévention des thromboses après un infarctus du myocarde et traitement de l'angine de poitrine instable:

100 mg 1 fois par jour.

Prévention de l'infarctus du myocarde chez les patients chez lesquels le médecin a constaté un risque élevé:

100 mg 1 fois par jour.

Prévention de l'aggravation d'une artériopathie oblitérante (artérite):

100 mg 1 fois par jour.

Il est recommandé de prendre les comprimés avec un peu de liquide, au moins une demi-heure avant le repas. Boire ensuite ½-1 verre de liquide. Les comprimés ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués.

En cas d'infarctus aigu du myocarde:

En cas de survenue d'un infarctus aigu du myocarde, 200 à 300 mg d'acide acétylsalicylique vous seront administrés par voie intraveineuse à l'hôpital. Il est également possible qu'une préparation rapidement résorbable d'acide acétylsalicylique (sous forme non gastrorésistante) vous soit administrée. Celle-ci peut être écrasée ou croquée lors de la prise orale pour atteindre une absorption rapide du principe actif. À partir du deuxième jour, la dose est de 100 mg d'ASS Cardio Sandoz par jour.

Le médecin traitant fixera la posologie et la durée d'administration.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

En cas de prise incontrôlée (surdosage), consultez sans tarder un médecin. Des bourdonnements d'oreilles et/ou des sueurs peuvent indiquer l'existence d'un surdosage.

Quels effets secondaires ASS Cardio Sandoz peut-il provoquer?

Fréquent (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 100)

Les troubles gastriques sont un effet indésirable fréquent.

Occasionnel (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 1000)

Des cas d'asthme, de troubles digestifs, de nausées, de vomissements et de diarrhées ont été rapportés occasionnellement.

Rare (concerne 1 à 10 utilisateurs sur 10'000)

Dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité (telles qu'un gonflement de la peau et des muqueuses (p.ex. nez bouché), une éruption cutanée, des difficultés respiratoires, une chute de la pression artérielle pouvant conduire à un choc) ainsi que des saignements et des ulcères gastro-intestinaux (conduisant éventuellement, mais très rarement, à des perforations) peuvent survenir.

Rarement, on observe des maux de tête, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des troubles de la vue, une déficience auditive, des états confusionnels, une anémie due à un manque de fer ainsi que des troubles des fonctions rénales et hépatiques.

Dans des cas rares à très rares, des saignements sévères ont été rapportés, en particulier chez les patients présentant une hypertension artérielle non contrôlée et/ou traités simultanément par des «fluidifiants sanguins» (anticoagulants) qui peuvent être potentiellement fatals dans des cas isolés.

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10'000)

Très rarement, des réactions cutanées sévères, une hypoglycémie, des perturbations de l'équilibre acido-basique ainsi qu'un syndrome de Reye (chez l'enfant) peuvent survenir.

Des hématomes, des saignements de nez, des gencives ou de la région génito-urinaire, ainsi que des saignements postopératoires ont été observés. Un allongement du temps de saignement est possible.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la bse des données disponibles)

Des cas de défaillance rénale soudaine ont été rapportés.

Des cas d'altération de la paroi intestinale, en particulier lors d'une utilisation à long terme, ont été rapportés.

Si vous présentez des signes d'hypersensibilité, il faut interrompre le traitement et consulter le médecin.

Des cas de Syndrome de Kounis (douleurs thoraciques dans le cadre de réactions allergiques sévères) ont été rapportés.

Si vous observez au cours du traitement une coloration noire des selles ou des vomissements accompagnés de sang, interrompez le médicament et consultez sans tarder le médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver dans l'emballage original, pas au-dessus de 30°C et hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient ASS Cardio Sandoz?

Principes actifs

1 comprimé gastrorésistant d'ASS Cardio Sandoz contient 100 mg d'acide acétylsalicylique.

Excipients

Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, amidon de pomme de terre, talc, triacétine, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) dispersion de à 30 pour cent (contient du laurilsulfate de sodium et du polysorbate 80).

1 comprimé gastrorésistant d'ASS Cardio Sandoz contient 60 mg de lactose monohydraté et 0.0057 mg de sodium.

Numéro d'autorisation

69724 (Swissmedic)

Où obtenez-vous ASS Cardio Sandoz? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

ASS Cardio Sandoz 100 mg: emballages de 30 et 100 comprimés gastrorésistants.

Titulaire de l'autorisation

Sandoz Pharmaceuticals SA, Risch; domicile: Rotkreuz

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2026 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).