

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

neo-angin® spray avec lidocaïne et chlorhexidine

Doetsch Grether AG

Qu'est-ce que neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine et quand doit-il être utilisé?

neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine contient les principes actifs lidocaïne et digluconate de chlorhexidine.

Le digluconate de chlorhexidine a des effets désinfectants, tandis que la lidocaïne soulage les douleurs et les difficultés de déglutition en agissant sur les muqueuses de la cavité bucco-pharyngée et du larynx. neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine est utilisé pour le traitement local des maladies inflammatoires aiguës de la cavité bucco-pharyngée, comme par exemple les aphtes, les gingivites et les inflammations de la muqueuse buccale.

Sur ordonnance médicale, neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine peut également être utilisé comme traitement d'appoint lors d'une angine, d'une laryngite, d'une pharyngite ou d'une infection fongique.

Quand neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine ne doit-il pas être utilisé?

neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine ne doit pas être utilisé lors d'une hypersensibilité connue à l'un des composants.

Les patients présentant une hypersensibilité aux anesthésiques locaux ne doivent pas utiliser neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine?

Le spray ne doit pas être utilisé en présence de plaies hémorragiques dans la cavité bucco-pharyngée.

En cas de fièvre importante ou en l'absence d'une amélioration en l'espace d'une semaine, le patient doit consulter un médecin.

Le médicament ne doit pas être avalé. Après l'application, les restes de liquide encore présents dans la bouche doivent être crachés.

Éviter tout contact avec les yeux.

Lors d'une utilisation régulière, il est possible que les dents prennent une teinte jaunâtre ou brunâtre. Celle-ci peut être éliminée par un nettoyage intensif des dents.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et la période d'allaitement, sauf sur ordonnance médicale.

Comment utiliser neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine?

Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 3 à 10 vaporisations par jour.



Vu les effets analgésiques du médicament, il est déconseillé de l'utiliser immédiatement avant un repas.

À ce jour, l'utilisation et la sécurité d'emploi n'ont pas été étudiées chez l'enfant.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Utilisation du spray

1. Tourner le vaporisateur fixé sur le côté du flacon, de façon à l'amener en position horizontale (la position verticale empêche une vaporisation).
2. Introduire le vaporisateur dans la cavité buccale. Tenir le flacon debout et presser le bouton de vaporisation. Vaporiser vers la zone affectée.

Quels effets secondaires neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine peut-il provoquer?

On observe rarement des réactions généralisées d'hypersensibilité. Dans un tel cas, il faut stopper le traitement et consulter un médecin immédiatement.

Des irritations localisées ont été observées occasionnellement. Dans le cadre d'une utilisation prolongée, on a constaté souvent des perturbations transitoires du sens gustatif, une sensation de brûlure dans la bouche et une coloration jaunâtre à brunâtre de la langue, des dents et de certains plombages et prothèses dentaires. La coloration des dents peut être éliminée par un nettoyage intensif des dents.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Le linge entré en contact avec neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine ne doit pas être lavé avec une lessive contenant de l'hypochlorite car cela pourrait provoquer des taches brunes. Utilisez en lieu et place une lessive à base de peroxyde ou de perborate.

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15-25°C), hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine?

1 ml de la solution de neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine contient:

Principes actifs

1,0 mg de digluconate de chlorhexidine; 2,0 mg de chlorhydrate de lidocaïne.

Excipients

Arômes, éthanol à 96%, propylène glycol et autres excipients.

neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine a une teneur volumique en alcool de 23,5%.

Numéro d'autorisation

58133 (Swissmedic).

Où obtenez-vous neo-angin spray avec lidocaïne et chlorhexidine? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Présentation



Flacon vaporisateur contenant 30 ml de *solution*.

Flacon vaporisateur contenant 50 ml de *solution*.

Titulaire de l'autorisation

Doetsch Grether AG, 4051 Bâle.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2008 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

