

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Stodal®, sciroppo

Boiron SA

Medicamento omeopatico

Quando si usa Stodal?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici, Stodal può essere usato in caso di tosse.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere Stodal.

Per i bambini di meno di 2 anni, l'origine della tosse deve essere medicalmente identificata, perciò Stodal non è raccomandato per l'uso su bambini di meno di 2 anni.

Se la tosse persiste dopo 7 giorni, consultare il medico o il farmacista.

Informazione destinata ai pazienti diabetici: Questo medicamento contiene 11.4 g di carboidrati digeribili per dose semplice di 15 ml.

Quando non si può usare Stodal sciroppo e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

Non si deve usare Stodal in caso d'ipersensibilità conosciuta ad uno dei componenti (specialmente al conservatore E210) o in caso di difficoltà respiratorie (ad es. accessi acuti d'asma bronchiale).

Non usare il medicamento senza parere del medico in caso d'affezioni alla ghiandola tiroidea.

Stodal contiene 11.4 g di saccarosio per dose di 15 ml. Questo deve essere preso in considerazione per i pazienti che soffrono di diabete mellito.

Questo medicamento contiene 15.9 mg di acido benzoico per dose di 15 ml.

Questo medicamento contiene 136 mg di alcol (etanolo) per dose di 15 ml. Una dose di 15 ml è equivalente a meno di 4 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità d'alcol contenuta in questo medicamento non è suscettibile di produrre effetti rilevanti.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)!

Si può assumere Stodal durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.



Come usare Stodal?

Salvo diversa prescrizione medica:

Adulti: una dose da 15 ml 3 a 5 volte al giorno.

Bambini dai 2 anni in su: una dose da 5 ml 3 a 5 volte al giorno.

Stodal non è raccomandato per i bambini di meno di 2 anni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Stodal?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con Stodal e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di Stodal.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Stodal?

1 g di sciroppo contiene

Principi attivi

Antimonium tartaricum (Ph. F.) 6 CH (Ph.Eur.Hom.4.1.2): 0.0095 g

Bryonia (Ph.F.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.0095 g

Coccus cacti (Ph. F.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.11): 0.0095 g

Drosera (Ph. F.) TM: 0.0095 g

Ipeca (Ph. F.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.0095 g

Pulsatilla (Ph. F.) 6 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.0095 g

Rumex crispus (Ph. F.) 6 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.10): 0.0095 g

Spongia tosta (Ph. F.) 3 CH (Ph.Eur.Hom.1.1.11): 0.0095 g

Sticta pulmonaria (Ph. F.) 3 CH: 0.0095 g

Sostanze ausiliarie

Saccarosio 0.609 g, acqua purificata, caramello (E150) 0.00125 g, acido benzoico (E210) 0.00085 g, etanolo.

Contenuto in etanolo: 1.15% V/V.

1 ml corrisponde a 1.25 g.



1 ml di sciroppo corrisponde a 3.04 kcal (12.92 kJ).

Numero dell'omologazione

56731 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Stodal? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Flacone da 200 ml con recipiente di dosaggio.

Titolare dell'omologazione

BOIRON SA – CH-1754 Avry-sur-Matran

Fabbricante

Boiron SA, Francia.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel luglio 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

