

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Betadine® savon liquide

Qu'est-ce que Betadine® savon liquide et quand doit-il être utilisé?

Betadine® savon liquide est un produit nettoyant dermatologique qui possède des propriétés germicides. Il détruit les bactéries, les champignons, les virus et d'autres agents infectieux.

Betadine® savon liquide est utilisé:

- pour le nettoyage désinfectant de la peau grasse,
- pour le nettoyage et la désinfection des cheveux et du cuir chevelu en cas d'affections du cuir chevelu,
- pour la désinfection hygiénique des mains lors d'activités comportant un risque d'infection ou lorsqu'il s'agit d'éviter la transmission de germes d'un patient à l'autre.

En cas de dermatomycoses, Betadine® savon liquide est utilisé uniquement sur prescription médicale.

À l'hôpital et en cabinet médical, Betadine® savon liquide est utilisé pour la désinfection des mains avant les interventions chirurgicales ainsi que pour la désinfection de la peau avant les opérations.

Quand Betadine® savon liquide ne doit-il pas être utilisé?

Betadine® savon liquide ne doit pas être utilisé:

- en présence de troubles fonctionnels et de maladies de la thyroïde (voir «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Betadine® savon liquide?»),
- en cas de dermatite herpétiforme de Dühring (très rare affection cutanée de type herpétique),
- avant, pendant et jusqu'à la fin d'un examen ou d'un traitement de la thyroïde par iode radioactif (irathérapie), que Betadine® savon liquide peut perturber,
- en cas d'utilisation concomitante de préparations contenant du mercure, l'iode et le mercure formant une substance susceptible de causer des lésions cutanées;
- chez les enfants de moins de 1 an,
- en cas d'hypersensibilité à la povidone iodée, à l'iode, aux savons (détergents) ou à un autre ingrédient.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Betadine® savon liquide?



Betadine® savon liquide est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement, car des troubles fonctionnels de la thyroïde peuvent survenir chez les enfants à naître et les nourrissons (voir «Betadine® savon liquide peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?»).

Betadine® savon liquide doit uniquement être utilisé sur prescription médicale chez les enfants âgés de 1 an à 6 ans. Un contrôle de la fonction thyroïdienne peut s'avérer nécessaire. Il est impératif d'éviter toute ingestion de Betadine® savon liquide par l'enfant.

Betadine® savon liquide ne doit pas être utilisé chez des patients atteints d'une maladie de la thyroïde, car il peut entraîner une hyperthyroïdie. Si vous souffrez d'une maladie de la thyroïde et avez utilisé Betadine® savon liquide, parlez-en à votre médecin afin qu'il ou elle contrôle votre fonction thyroïdienne, le cas échéant.

Pour la désinfection cutanée avant une intervention chirurgicale, il convient d'éviter l'accumulation de Betadine® savon liquide dans les plis cutanés ou sous le patient, car un contact prolongé de la peau peut entraîner des irritations cutanées et, dans de rares cas, des réactions cutanées sévères semblables à des brûlures.

Betadine® savon liquide ne doit pas s'infiltrer sous les zones de contact des électrodes.

En cas d'hypersensibilité présumée à l'iode, il est recommandé de vérifier la tolérance avant l'application sur une petite zone.

Du fait de la couleur de Betadine® savon liquide, une décoloration passagère de la peau peut survenir au niveau du site d'application.

Le savon liquide ne doit pas être chauffé avant son utilisation.

Si vous souffrez d'un trouble de la fonction rénale, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser Betadine® savon liquide.

Betadine® savon liquide ne doit pas être utilisé ou le traitement doit être arrêté en cas d'hyperacidité métabolique du sang (acidose métabolique) et d'insuffisance rénale.

Betadine® savon liquide ne doit pas être utilisé en même temps ou immédiatement après des produits enzymatiques pour le traitement des plaies ou des désinfectants contenant du mercure (voir «Quand Betadine® savon liquide ne doit-il pas être utilisé?»), de la sulfadiazine argentique, du peroxyde d'hydrogène ou de la taurolidine, car cela peut entraîner une atténuation réciproque de leur action.

Betadine® savon liquide ne doit pas être appliqué en même temps ou immédiatement après des antiseptiques contenant de l'octénidine sur les mêmes zones cutanées ou à proximité, étant donné le risque de décoloration foncée passagère des zones concernées.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!)

Betadine® savon liquide peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Betadine® savon liquide est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement, car l'enfant à naître ou le nouveau-né est exposé à des quantités significatives d'iode par le biais de la mère et de graves troubles



fonctionnels de la thyroïde peuvent survenir chez le nouveau-né.

Toute absorption orale accidentelle de Betadine® savon liquide par contact buccal du nourrisson avec la zone traitée de la mère qui allaite doit être évitée. Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Comment utiliser Betadine® savon liquide?

Adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans

Sauf indication contraire de votre médecin, utilisez Betadine® savon liquide comme suit.

Pour le nettoyage désinfectant de la peau

Bien humecter la peau. Appliquer un peu de Betadine® savon liquide sur la zone à traiter et faire mousser avec les doigts ou avec un tampon d'ouate propre. Laisser agir la mousse pendant 1 à 3 minutes.

Rincer.

Sécher en tamponnant avec un linge ou une serviette en papier propre.

En cas de mycoses, appliquer jusqu'à 3 fois par jour; en cas de peau grasse et d'impuretés cutanées, utiliser plusieurs fois par semaine.

Pour l'utilisation en tant que shampoing désinfectant

Bien mouiller les cheveux et y répartir environ 2 cuillères à café de Betadine® savon liquide. Bien frictionner les cheveux et masser le cuir chevelu avec le savon jusqu'à ce qu'une mousse jaunâtre dense se forme. Si nécessaire, ajouter un peu d'eau pour mieux faire mousser.

Bien rincer et essorer les cheveux.

Répéter le processus et laisser agir la mousse pendant 5 minutes au moins.

Rincer abondamment les cheveux et les sécher comme après un shampoing ordinaire.

Le traitement doit être renouvelé 2 fois par semaine, jusqu'à amélioration. Ensuite, une seule application par semaine suffit.

Pour la désinfection hygiénique des mains

Bien humecter les mains et les avant-bras. Verser 5 ml de Betadine® savon liquide dans le creux de la main et frictionner soigneusement les mains et les avant-bras pendant 1 minute. Ajouter un peu d'eau pour mieux faire mousser.

Bien rincer.

Sécher.

Pour la désinfection chirurgicale des mains et la désinfection préopératoire de la peau, veuillez consulter l'information professionnelle du médicament.

Enfants de 1 an à 6 ans

Betadine® savon liquide ne doit pas être utilisé chez les nouveau-nés et les nourrissons de moins de 1 an (voir «Quand Betadine® savon liquide ne doit-il pas être utilisé?»). Chez les enfants jusqu'à 6 ans, Betadine® savon liquide peut être utilisé uniquement sur prescription médicale (voir «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Betadine® savon liquide?»).

En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement votre médecin.



Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Betadine® savon liquide peut-il provoquer?

Rare (concerne 1 à 10 personnes sur 10 000)

Dans de rares cas, des réactions d'hypersensibilité ou une dermatite de contact (s'accompagnant de symptômes tels que rougeurs cutanées, vésicules et démangeaisons) peuvent survenir.

Très rare (concerne moins d'une personne sur 10 000)

Dans de très rares cas, des gonflements aigus et douloureux de la peau ou des muqueuses (angioœdème), ou des réactions allergiques générales aiguës s'accompagnant parfois d'une chute de tension artérielle et/ou d'une détresse respiratoire (réaction anaphylactique), peuvent être observés. Le traitement doit alors être immédiatement interrompu et le médecin doit être informé sans tarder.

Une absorption notable d'iode peut survenir en cas d'application prolongée sur des surfaces cutanées, des plaies ou des brûlures étendues et avoir des effets sur la fonction thyroïdienne. Dans de très rares cas, une hyperthyroïdie caractérisée par des symptômes tels qu'accélération du pouls ou agitation peut être observée chez des patients présentant une maladie de la thyroïde.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

Une hypothyroïdie, un déséquilibre électrolytique, une hyperacidité métabolique du sang (acidose métabolique), une insuffisance rénale aiguë, une osmolarité sanguine anormale et une décoloration de la peau peuvent survenir.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C).

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas ingérer.

Remarques complémentaires

Les taches de Betadine® savon liquide sont éliminées à l'eau et au savon sur les fibres naturelles, à l'ammoniaque diluée ou à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodium sur les fibres synthétiques.



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Betadine® savon liquide?

Principes actifs

1 ml de solution pour application cutanée contient 75 mg de povidone iodée équivalant à 7,5 mg d'iode disponible.

Excipients

Coco-glucoside, laureth sulfate de sodium, glycérol, hydroxyéthylcellulose, phosphate disodique, acide citrique monohydraté, hydroxyde de sodium, iodate de potassium, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

34286 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Betadine® savon liquide? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

120 ml et 500 ml

Titulaire de l'autorisation

iNova Pharmaceuticals (Switzerland) AG, Zug

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mai 2024 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

