

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Betadine® sapone liquido

Che cos'è Betadine® sapone liquido e quando si usa?

Betadine® sapone liquido è un detergente per la pelle con proprietà germicide. Uccide batteri, funghi, virus e altri agenti patogeni che provocano infezioni.

Betadine® sapone liquido si usa:

- per la pulizia disinfettante della pelle grassa,
- per la pulizia e la disinfezione dei capelli e del cuoio capelluto in caso di malattie del cuoio capelluto,
- per la disinfezione igienica delle mani in attività che comportano un pericolo d'infezione o in cui occorre evitare la trasmissione di germi da un paziente all'altro.

Solo su prescrizione medica, Betadine® sapone liquido si usa di micosi della pelle.

Negli ospedali e negli studi medici, Betadine® sapone liquido viene usato per la disinfezione delle mani prima di interventi chirurgici e per la disinfezione della pelle prima di operazioni.

Quando non si può usare Betadine® sapone liquido?

Betadine® sapone liquido non deve essere usato:

- in caso di disfunzioni e malattie della tiroide (cfr. anche «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Betadine® sapone liquido?»),
- in caso di dermatite erpetiforme di Dühring (una malattia della pelle molto rara, simile all'herpes),
- prima, durante e fino alla fine di un esame o di un trattamento della tiroide con iodio radiomarcato (terapia con radioiodio), poiché Betadine® sapone liquido può influenzare tale esame o trattamento,
- in caso di uso concomitante di preparati contenenti mercurio, perché ciò forma una sostanza che può danneggiare la pelle,
- nei bambini di età inferiore a 1 anno,
- in caso di ipersensibilità allo iodopovidone, allo iodio, ai saponi (detergenti) o a un altro ingrediente.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Betadine® sapone liquido?

Betadine® sapone liquido non deve essere usato durante la gravidanza e l'allattamento perché nei nascituri e nei lattanti possono comparire disfunzioni della tiroide (cfr. «Si può usare Betadine® sapone liquido durante la gravidanza o l'allattamento?»).



Betadine® sapone liquido può essere usato nei bambini piccoli da 1 a 6 anni di età solo su prescrizione medica. Può essere necessario un controllo della funzione tiroidea. L'ingestione di Betadine® sapone liquido da parte dei bambini deve essere assolutamente evitata.

Betadine® sapone liquido non deve essere utilizzato in pazienti con disturbi della tiroide perché può causare ipertiroidismo. Se soffre di una malattia della tiroide e ha usato Betadine® sapone liquido, si rivolga al suo medico affinché, se necessario, controlli la sua funzionalità tiroidea.

Quando si effettua la disinfezione della pelle prima di un'operazione, bisogna evitare che Betadine® sapone liquido si accumuli nelle pieghe cutanee o sotto il paziente perché un contatto prolungato con la pelle può provocare irritazioni e, in casi rari, anche gravi reazioni cutanee simili a ustioni.

Betadine® sapone liquido non deve penetrare sotto i punti di contatto degli elettrodi.

In caso di sospetta ipersensibilità allo iodio, si raccomanda di verificare la tollerabilità su una piccola area di pelle prima dell'uso.

A causa del colore di Betadine® sapone liquido può verificarsi una temporanea alterazione del colore della pelle nel punto in cui viene applicato.

Il sapone liquido non deve essere riscaldato prima dell'uso.

Se soffre di un disturbo della funzionalità renale, si rivolga al suo medico prima di utilizzare Betadine® sapone liquido.

Betadine® sapone liquido non deve essere utilizzato o il trattamento deve essere interrotto in caso di iperacidità metabolica del sangue (acidosi metabolica) e di insufficienza renale.

Betadine® sapone liquido non deve essere utilizzato in concomitanza o subito dopo l'uso di agenti enzimatici per il trattamento di ferite o disinfettanti contenenti mercurio (cfr. «Quando non si può usare Betadine® sapone liquido?»), sulfadiazina argentica, perossido di idrogeno o taurolidina perché può verificarsi una reciproca riduzione dell'efficacia.

Non usare Betadine® sapone liquido in concomitanza o subito dopo l'uso di disinfettanti a base di octenidina sulle stesse aree o su aree vicine perché nelle parti interessate possono formarsi alterazioni scure e temporanee del colore.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa!) o li applica esternamente!

Si può usare Betadine® sapone liquido durante la gravidanza o l'allattamento?

Betadine® sapone liquido non deve essere usato durante la gravidanza e l'allattamento, perché il nascituro o il neonato è esposto a quantità rilevanti di iodio attraverso la madre e nel neonato possono comparire gravi disfunzioni della tiroide.

Deve essere evitata l'ingestione accidentale di Betadine® sapone liquido da parte del lattante attraverso il contatto della bocca con la parte trattata del corpo della madre che allatta. Se è incinta oppure allatta, informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Come usare Betadine® sapone liquido?



Adulti, adolescenti e bambini dai 6 anni di età

Salvo diversa prescrizione del suo medico, usi Betadine® sapone liquido come segue:

Per la pulizia disinfettante della pelle

Bagnare bene la pelle. Applicare un po' di Betadine® sapone liquido sull'area da trattare e creare una schiuma strofinando con un dito o un batuffolo di cotone pulito. Lasciare agire la schiuma per 1--3 minuti. Sciacquare.

Asciugare tamponando con una salvietta di stoffa o di carta pulita.

Utilizzare fino a 3 volte al giorno in caso di infezioni da funghi; in caso di impurità della pelle o di pelle grassa, utilizzare più volte alla settimana.

Come shampoo disinfettante

Bagnare bene i capelli e distribuirvi circa 2 cucchiaini di Betadine® sapone liquido. Massaggiare bene il sapone nei capelli e sul cuoio capelluto fin quando non si sarà formata una densa schiuma giallastra. Se necessario, per favorire la formazione di schiuma, aggiungere un po' d'acqua.

Sciacquare bene i capelli e strizzarli.

Ripetere il procedimento e lasciare agire la schiuma per almeno 5 minuti.

Sciacquare accuratamente i capelli e asciugarli come dopo un normale lavaggio.

Il trattamento va ripetuto 2 volte a settimana fino al miglioramento. Dopodiché, è sufficiente un utilizzo settimanale.

Per la disinfezione igienica delle mani

Bagnare bene le mani e gli avambracci. Versare 5 ml di Betadine® sapone liquido nell'incavo della mano e strofinarlo accuratamente sulle mani e sugli avambracci per un minuto. Per favorire la formazione di schiuma, aggiungere un po' d'acqua.

Sciacquare bene.

Asciugare.

Per indicazioni riguardo alla disinfezione chirurgica delle mani e per la disinfezione preoperatoria della pelle, cfr. l'informazione professionale del medicamento.

Bambini di età compresa tra 1 e 6 anni

Betadine® sapone liquido non deve essere utilizzato in neonati e lattanti di età inferiore a 1 anno (cfr. «Quando non si può usare Betadine® sapone liquido?»). Nei bambini piccoli fino a 6 anni, utilizzare solo su prescrizione medica (cfr. «Quando è richiesta prudenza nell'uso di Betadine® sapone liquido?»).

In caso di ingestione accidentale occorre avvertire subito il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Betadine® sapone liquido?

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)



In casi rari possono verificarsi reazioni da ipersensibilità o dermatite da contatto (con sintomi quali arrossamento della pelle, vescicole, prurito).

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

In casi molto rari possono verificarsi gonfiori acuti e dolorosi della pelle o delle mucose (angioedema) nonché reazioni allergiche generali acute, eventualmente con abbassamento della pressione sanguigna e/o affanno respiratorio (reazione anafilattica). In questi casi bisogna interrompere immediatamente il trattamento e informare il medico.

L'uso prolungato su aree di pelle, ferite o ustioni estese può comportare un significativo assorbimento di iodio, che può avere effetti sulla funzionalità della tiroide. In casi molto rari, i pazienti con malattie della tiroide possono sviluppare ipertiroidismo, con sintomi quali battito cardiaco accelerato o irrequietezza interiore.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Possono comparire ipotiroidismo, alterazioni dell'equilibrio elettrolitico, iperacidità metabolica del sangue (acidosi metabolica), insufficienza renale acuta, osmolarità anormale del sangue e alterazione del colore della pelle.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non ingerire.

Ulteriori indicazioni

Le macchie di Betadine® sapone liquido possono essere rimosse dalle fibre naturali con acqua e sapone e dalle fibre sintetiche con ammoniaca diluita o con soluzione di sodio tiosolfato.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Betadine® sapone liquido?

Principi attivi

1 ml di soluzione cutanea contiene 75 mg di iodopovidone, corrispondenti a 7,5 mg di iodo disponibile.

Sostanze ausiliarie



Glucosidi di cocco, sodio laurile etere solfato, glicerolo, idrossietilcellulosa, sodio fosfato dibasico, acido citrico monoidrato, sodio idrossido, potassio iodato, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

34286 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Betadine® sapone liquido? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

120 ml e 500 ml.

Titolare dell'omologazione

iNova Pharmaceuticals (Switzerland) AG, Zug

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

