

Qu'est-ce que Derma-Merfen Pommade relipidante et quand doit-il être utilisé?

Derma-Merfen Pommade relipidante contient du dexpanthénol et de l'huile de tournesol raffinée.

Dans les cellules de la peau, le dexpanthénol est converti en acide pantothénique, une vitamine. L'acide pantothénique contribue aussi bien à la formation qu'au rétablissement de la peau. Derma-Merfen Pommade relipidante est utilisé pour soigner la peau sèche, sensible ou irritée.

Soins aux nourrissons: Prévention et traitement des plaies, des rougeurs cutanées, des inflammations non infectées au contact des langes ainsi que de la peau sèche.

Allaitement: Prévention et traitement des mamelons gercés ou enflammés mais non infectés.

Généralités: Traitement des irritations cutanées, des coups de soleil ou des petites plaies non infectées. Soin de la peau sèche.

Après entente avec votre médecin, pharmacien ou droguiste, Derma-Merfen Pommade relipidante peut aussi être utilisé dans le traitement adjuvant de différentes maladies cutanées (p.ex. croûtes de lait).

Quand Derma-Merfen Pommade relipidante ne doit-il pas être utilisé?

Derma-Merfen Pommade relipidante ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à l'un de ses principes actifs ou excipients (voir composition).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Derma-Merfen Pommade relipidante?

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Ce médicament contient 30 mg de propylène glycol par 1 g de pommade. Ne pas utiliser ce médicament chez les bébés de moins de 4 semaines présentant de grandes zones de peau endommagée sans en informer au préalable votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament contient 30 mg d'alcool stéarylique par 1 g de pommade. Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Ce médicament contient 1 mg de parahydroxybenzoate de propyle (E216) et 2 mg de parahydroxybenzoate de méthyle (E218) par 1 g de pommade. Peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Veuillez informer votre médecin, pharmacien ou droguiste si vous ou votre bébé

- souffrez d'autres maladies
- êtes allergique
- ou prenez d'autres médicaments (même en automédication!) en usage interne ou externe.

Derma-Merfen Pommade relipidante peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Derma-Merfen Pommade relipidante peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Avant de mettre le nourrisson au sein, veuillez éliminer soigneusement la pommade adhérant au mamelon.

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser Derma-Merfen Pommade relipidante?



Soins aux nourrissons: Appliquez Derma-Merfen Pommade relipidante de 1 à 4 fois par jour sur la partie enflammée ou gercée du corps. Par mesure de prévention, il est conseillé d'étaler Derma-Merfen Pommade relipidante après chaque changement de linge et ce sur tout le fessier et les parties génitales du nourrisson, après avoir soigneusement lavé le tout à l'eau.

Allaitement: Après chaque séance d'allaitement, appliquez une gaze imprégnée de Derma-Merfen Pommade relipidante sur le mamelon.

Généralités: En cas de peau sèche, Derma-Merfen Pommade relipidante peut être utilisé plusieurs fois par jour en fonction des besoins. Pour traiter les petites plaies ou les coups de soleil, appliquez Derma-Merfen Pommade relipidante de 1 à 4 fois par jour sur les parties du corps à traiter.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Derma-Merfen Pommade relipidante peut-il provoquer?

Aucun effet secondaire de Derma-Merfen Pommade relipidante n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires (p.ex. des réactions cutanées inhabituelles), veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Derma-Merfen Pommade relipidante?

1 g de pommade contient:

Principes actifs

250 mg d'huile de tournesol raffinée (*Helianthi annui oleum raffinatum*), 50 mg de dexpanthénol.

Excipients

Vaseline blanche, propylène glycol (E1520), alcool stéarylique, lécithine de soja, stéarate de sorbitan, stéarate de macrogol 40, carbomère 980, phénoxyéthanol, parahydroxybenzoate de propyle (E216), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), hydroxyde de sodium, α -tocophérol, eau purifiée.

Numéro d'autorisation

15812 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Derma-Merfen Pommade relipidante? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube de 60 g et 100 g.

Titulaire de l'autorisation

VERFORA SA, 1752 Villars-sur-Glâne



Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

