

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Decatylen Neo, pastilles

Qu'est-ce que Decatylen Neo et quand doit-il être utilisé?

Decatylen Neo combat les bactéries et les champignons responsables des maux de gorge et des infections buccales. La cinchocaïne, un des principes actifs des pastilles, atténue les sensations douloureuses.

Decatylen Neo s'utilise pour le traitement local des affections bucco-pharyngiennes aiguës, telles que maux de gorge, aphtes, infections buccales, enrouement et catarrhe. Selon recommandation du médecin, du pharmacien ou du droguiste, Decatylen Neo s'utilise aussi à la suite d'opérations des amygdales et d'extractions dentaires, afin d'accélérer la guérison, et comme adjuvant dans le traitement de l'angine.

Decatylen Neo est également recommandé en cas de mauvaise haleine.

Quand Decatylen Neo ne doit-il pas être utilisé?

Les patients qui sont hypersensibles à l'un des constituants de Decatylen Neo ne doivent pas prendre la préparation.

Si vous présentez une intolérance héréditaire au fructose (IHF), une maladie génétique rare, empêchant la décomposition du fructose, vous ne devez pas recevoir Decatylen Neo.

Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de la prise de Decatylen Neo?

Aucune précaution particulière n'est à observer en cas d'utilisation conforme au mode d'emploi.

Decatylen Neo contient 1066,15 mg de sorbitol par pastille.

Si votre médecin vous a informé(e) que vous (ou votre enfant) présentiez une intolérance à certains sucres ou si vous avez été diagnostiqué(e) avec une intolérance héréditaire au fructose (IHF), un trouble génétique rare caractérisé par l'incapacité à décomposer le fructose, parlez-en à votre médecin avant que vous (ou votre enfant) ne preniez ou ne receviez ce médicament.

Le sorbitol peut causer une gêne gastro-intestinale et un effet laxatif léger.

En cas de fièvre élevée, ou si après une semaine de traitement aucune amélioration ne se manifeste, il est nécessaire de consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments externe (même en automédication!).

Decatylen Neo peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?



Si vous êtes enceinte, ou si vous souhaitez le devenir, ou pendant la période d'allaitement, vous ne devez pas prendre Decatylen Neo sauf si votre médecin vous l'a expressément prescrit.

Comment utiliser Decatylen Neo?

Sauf prescription contraire:

Adultes et adolescents de plus de 12 ans

Laisser fondre lentement dans la bouche 1 pastille toutes les 2 heures. Après régression des manifestations inflammatoires, sucer 1 pastille toutes les 4 heures.

Enfants de plus de 4 ans

Laisser fondre lentement dans la bouche 1 pastille toutes les 3 heures. Après régression des manifestations inflammatoires, sucer 1 pastille toutes les 4 heures.

Enfants de moins de 4 ans

Decatylen Neo ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.

Veuillez vous conformer au dosage figurant dans la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Decatylen Neo, pastilles ont une rainure de décoration, mais ne doivent pas être divisées.

Quels effets secondaires Decatylen Neo peut-il provoquer?

La prise de Decatylen Neo peut provoquer les effets secondaires suivants:

Occasionnel (concerne 1 à 10 personnes sur 1000)

- Réactions allergiques (d'hypersensibilité), comme urticaire, rougeurs, gonflements.

Très rare (concerne moins d'une personnes sur 10 000)

- Eczémas de contact.

Fréquence inconnue (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- Fièvre

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Stabilité

Decatylen Neo ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Conserver Decatylen Neo, pastilles dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, au sec et à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires



Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Decatylen Neo?

1 pastille contient:

Principes actifs

Chlorhydrate de déqualinium 0,25 mg
Chlorhydrate de cinchocaïne 0,03 mg.

Excipients

Sorbitol (E 420, 1066,15 mg par pastille), talc, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, arôme de menthe poivrée, huile essentielle de menthe poivrée.

Numéro d'autorisation

50018 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Decatylen Neo? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Emballages de 30 pastilles (avec rainure de décoration).

Titulaire de l'autorisation

Acino Pharma AG, Liesberg

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en décembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

