

Qu'est-ce que l'Hexamedal et quand est-il utilisé?

L'Hexamedal est une solution antiseptique pour lavage et rinçage bucco-pharyngé indiquée pour le traitement des inflammations et saignements de la gencive, des aphtes, des inflammations de la gorge, en traitement pré- ou postopératoire de l'amygdalectomie (ablation des amygdales), pour le traitement de lésions bucco pharyngées, pour l'hygiène buccale et le traitement des mauvaises haleines. L'Hexamedal est également indiqué comme traitement de soutien des angines.

Quand l'Hexamedal ne doit-il pas être utilisé?

L'Hexamedal ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'une des substances actives.

Quelles sont les précautions à observer lors de prise d'Hexamedal?

L'Hexamedal doit être utilisé avec précaution en cas d'inflammation de la membrane alvéolodentaire.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique vous prenez d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Mesures de précaution

Veuillez consulter un médecin en cas de forte fièvre ou si votre état ne présente pas d'amélioration dans l'intervalle d'une semaine.

Une utilisation régulière peut entraîner une coloration jaune ou brune des dents cédant à un brossage intensif.

L'Hexamedal peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?

En cas de grossesse avérée ou planifiée et pendant l'allaitement, il est conseillé de renoncer si possible à prendre des médicaments ou de demander l'avis du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Comment utiliser l'Hexamedal?

Sauf prescription contraire de votre médecin: Se rincer la bouche ou se gargariser pendant 30 secondes avec 15 ml (mesurette) d'Hexamedal.

Cracher ensuite la solution.

Traitement local: tamponner la partie affectée à l'aide d'un coton imbibé l'Hexamedal.

Le traitement à l'Hexamedal doit être utilisé deux fois par jour, éventuellement plus souvent.

Veuillez vous conformer à la posologie figurant sur la notice d'emballage ou prescrite par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou à votre droguiste.

L'utilisation et la sûreté de la solution Hexamedal n'a pas été testée scientifiquement chez les enfants.

Quels effets secondaires l'Hexamedal peut-il provoquer?

La prise ou l'utilisation d'Hexamedal peut provoquer les effets secondaires suivants:

Fréquente apparition d'une coloration dentaire en cas d'utilisation à long terme. Dans la plupart des cas, cette coloration disparaît à l'arrêt du traitement.

Une perturbation des sensations gustatives a été occasionnellement constatée.

Les cas de réaction allergique sont rares.

Si vous remarquez des effets secondaires ne figurant pas ici, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.



A quoi faut-il encore faire attention?

Conserver le médicament hors de la portée des enfants.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention EXP sur le récipient.

Conserver le médicament à température ambiante (15 à 25 °C).

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d'une information scientifique détaillée.

Que contient l'Hexamedal?

1 ml contient: chlorhexidine gluconate 1 mg, substances aromatiques, colorant: jaune de quinoléine (E 104), (7% alcool v/v).

Numéro d'autorisation

45174 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Hexamedal? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnement de 250 ml.

Titulaire de l'autorisation

Dr. H. Welte AG, Gebenstorf.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2003 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

