

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Fucidin® compresse rivestite con film

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd.

Che cos'è Fucidin e quando si usa?

Fucidin è un antibiotico e viene usato per uccidere vari batteri patogeni nel corpo.

Fucidin deve essere usato soltanto su prescrizione medica per il trattamento di infezioni.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Questo medicamento le è stato prescritto dal medico per il trattamento della sua malattia attuale.

L'antibiotico contenuto in Fucidin non è efficace contro tutti i microorganismi che causano malattie infettive. L'applicazione di un antibiotico scelto sbagliamento o non correttamente dosato può causare delle complicazioni. Quindi, non lo usi di sua iniziativa per il trattamento di altre malattie o per altre persone. Anche nel caso di nuove infezioni ulteriori non deva usare Fucidin senza consultare di nuovo il medico.

Quando non si può assumere Fucidin?

Fucidin non deve essere assunto nel caso di ipersensibilità conosciuta o sospetta all'acido fusidico (sostanza attiva di Fucidin).

Dato che con l'assunzione di Fucidin compresse rivestite con film sono manifestati casi isolati di interazioni farmacologiche pericolose per la vita, Fucidin compresse rivestite con film non devono essere assunto contemporaneamente ai medicinali che abbassano i grassi nel sangue (cosiddette statine).

In generale, deve rivolgersi al suo medico prima di assumere altri medicinali insieme a Fucidin.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Fucidin?

Poiché Fucidin viene principalmente degradato nel fegato ed eliminato attraverso le vie biliari, è richiesta prudenza nei casi di malattie al fegato o alle vie biliari. Ciò vale in particolare se assume altri antibiotici insieme a Fucidin, che vengono eliminati anche attraverso le vie biliari o altri medicinali che possono danneggiare il fegato.

La somministrazione a lungo termine può portare alla crescita eccessiva di germi e funghi non sensibili. Nel caso di una tale superinfezione occorre deve essere iniziata una terapia appropriata.

Fucidin può modificare l'effetto degli anticoagulanti. Prudenza è anche richiesta se assume Fucidin insieme agli inibitori delle HIV proteasi. Inoltre, prudenza è anche richiesta se assume Fucidin insieme ai medicinali contenenti il principio attivo ciclosporina. Informi il suo medico se assume anticoagulanti, inibitori delle HIV proteasi o medicinali contenenti il principio attivo ciclosporina.

Consulti immediatamente il suo medico se si manifestano dolori muscolari, sensibilità muscolare o debolezza muscolare inspiegabile. In rari casi i problemi muscolari possono essere gravi, inclusa la disgregazione muscolare che può provocare danni ai reni.

Dopo l'assunzione di Fucidin sono stati riportati alcuni casi di reazioni cutanee gravi che possono svilupparsi in reazioni cutanee potenzialmente pericolose per la vita se non vengono trattate. Interrompa l'assunzione di Fucidin e consulti immediatamente il suo medico se si manifestano uno o più dei seguenti sintomi:

- eruzioni cutanee o arrossamenti, compresa eruzione cutanea su una vasta superficie con vescicole e desquamazione della pelle, vescicole in bocca, gola, intorno al naso, agli occhi e ai genitali (Sindrome di Stevens-Johnson)



- estesa desquamazione della pelle (necrolisi epidermica tossica)
- estese eruzioni cutanee o sintomi allergici (p.es. gonfiori nel viso o in altre parti del corpo) noti anche come sindrome DRESS.

Queste gravi eruzioni cutanee sono spesso precedute da sintomi simil-influenzali come febbre, mal di testa e dolori al corpo (veda anche il capitolo «Quali effetti collaterali può avere Fucidin?»).

Prenda Fucidin compresse rivestite con film solo dopo aver consultato il suo medico se sa di soffrire di intolleranza allo zucchero.

I pazienti affetti da una rara intolleranza ereditaria al galattosio, deficit completo di lattasi o malassorbimento di glucosio-galattosio devono rinunciare all'assunzione di Fucidin a causa del contenuto in lattosio.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compresse, cioè essenzialmente «senza sodio».

Questo medicamento può ridurre la capacità di reazione, la capacità di condurre un veicolo e la capacità di utilizzare attrezzi o macchine!

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente!

Si può assumere Fucidin durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta, desidera diventare incinta o sta allattando, deve assumere Fucidin soltanto dopo aver consultato il suo medico o il suo farmacista.

Lasci decidere al suo medico o al suo farmacista se deve assumere il Fucidin durante la gravidanza o l'allattamento.

Come usare Fucidin?

Salvo diversa prescrizione dal suo medico prenda le compresse rivestite con film durante i pasti (per evitare problemi digestivi) secondo la seguente posologia:

Adulti: 3x al giorno 2 compresse rivestite con film da 250 mg.

Bambini da 6 anni: 3x al giorno 1 compressa rivestita con film da 250 mg.

Bambini di età inferiore ai 6 anni: Fucidin compresse rivestite con film non è adatto al trattamento di infezioni nei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Infezioni della pelle e delle parti molli

Adulti: 2x al giorno 1 compressa rivestita con film da 250 mg. Questa posologia può essere raddoppiata nei casi più gravi.

Una terapia antibiotica iniziata deve essere eseguita per tutto il tempo prescritto dal medico. Né la dose giornaliera né la durata della terapia deve essere modificata senza aver consultato il suo medico o il suo farmacista. Spesso i sintomi della malattia scompaiono prima che l'infezione sia completamente guarita. Una durata insufficiente dell'uso o la terminazione prematura del trattamento può causare di nuovo una riacutizzazione della malattia.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Fucidin?

Durante la presa di Fucidin possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)



Disturbi digestivi, disturbi allo stomaco, dolori allo stomaco, nausea, vomito o diarrea. Se Fucidin compresse rivestite con film viene preso durante i pasti, i disturbi gastrointestinali sono meno frequenti.

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Modificazioni del quadro ematico, mal di testa, sonnolenza, reazioni di ipersensibilità, eruzioni cutanee, stanchezza, mancanza di forza, debolezza, problemi al fegato (epatite (ittero), insufficienza epatica, alterazioni dei valori epatici), insufficienza renale, shock anafilattico / reazioni anafilattiche, dolori muscolari, sensibilità o debolezza muscolare.

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10 000)

Gonfiore della pelle, delle mucose e del tessuto adiacente (angioedema), prurito, arrossamento della pelle.

Molto raro (riguarda meno di 1 utilizzatore su 10 000)

Molto raramente, so sono osservati sintomi simil-influenzali con eruzione cutanea, febbre, ghiandole gonfie e anomalie dei valori del sangue (inclusi globuli bianchi (eosinofilia) ed enzimi epatici), esantema da farmaci con eosinofilia e sintomi sistemici (DRESS), necrosi epidermica tossica (TEN, sindrome di Lyell) e la sindrome di Stevens-Johnson (SJS) (vedere «Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di Fucidin»).

In alcuni pazienti trattati con il Fucidin si sono anche manifestati dei casi di itterizia reversibile. Se l'itterizia persiste, il trattamento con Fucidin deve essere interrotto fino a quando i valori della bilirubina nel sangue non si siano normalizzati.

L'assunzione di Fucidin compresse rivestite con film può causare congestione della bile e degradazione delle fibre muscolari scheletriche, con conseguente comparsa di debolezza muscolare e dolori. Se si manifestano questi sintomi, informi immediatamente il suo medico.

Se sviluppa un'eruzione cutanea con vescicole purulente e febbre, deve consultare immediatamente il suo medico. Questa potrebbe essere una condizione nota come pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP). Il medico deciderà quindi se deve terminare l'assunzione di Fucidin rivestite con film.

Sono stati segnalati alcuni casi di reazioni cutanee gravi che, possono svilupparsi in reazioni cutanee potenzialmente pericolose per la vita, se non trattate. Consulti immediatamente il suo medico se si manifestano i sintomi di tali reazioni. I segni di tali reazioni cutanee sono eruzioni cutanee o arrossamenti, compresa eruzione cutanea su vaste aree con vescicole e desquamazione della pelle, vescicole in bocca, gola, intorno al naso, agli occhi e ai genitali, febbre, bruciore agli occhi e disagio durante la deglutizione (vedere anche il capitolo «Quando occorre prudenza nella somministrazione di Fucidin?»).

Consulti immediatamente il suo medico se si manifestano i sintomi seguenti:

- orticaria, eruzione cutanea su vaste aree, arrossamenti della pelle;
- colore giallastro della pelle o della parte bianca degli occhi;
- comparsa improvvisa di dolore addominale o di vomito;
- problemi respiratori sotto forma di attacchi di asma e di raffreddore da fieno.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Ulteriori indicazioni

Dopo la terminazione del trattamento, il medicamento con il contenuto rimanente deve essere riportato al suo posto di distribuzione (medico o farmacia) per l'eliminazione controllata!

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Fucidin?

Principi attivi

1 compressa rivestita con film contiene 250 mg di fusidato di sodio (contenuto di sodio: 10,7 mg).

Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, crospovidone, talco, magnesio stearato, silice colloidale anidra, alpha-tocoferolo, ipromellose, titanio diossido (E 171).

Numero dell'omologazione

34371 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Fucidin? Quali confezioni sono disponibili?

Fucidin compresse rivestite con film sono disponibile in farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

In confezioni da 20 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Kloten

Domicilio: Zurigo

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

