

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Ovestin® Crème

Qu'est-ce que Ovestin Crème et quand doit-elle être utilisée?

La crème vaginale Ovestin Crème contient de l'estriol, une hormone identique à l'hormone sexuelle féminine naturelle. On utilise donc Ovestin Crème pour traiter les troubles survenant pendant ou après la ménopause ou après une ablation chirurgicale des ovaires. L'estriol provoque une amélioration rapide et durable des symptômes typiques induits par une carence en œstrogènes, des phénomènes liés à une atrophie des organes génitaux féminins externes et internes avec des symptômes tels que démangeaisons, douleurs lors des rapports sexuels ou émission involontaire d'urine et écoulement.

On utilise également Ovestin Crème pour le traitement adjuvant des inflammations du vagin et pour la préparation aux opérations vaginales. En outre, ce médicament normalise la peau et les muqueuses des organes génitaux féminins externes et internes.

Ovestin Crème ne doit être utilisée que sur prescription médicale, et le médecin doit suivre l'évolution du traitement en pratiquant des examens appropriés.

Quand Ovestin Crème ne doit-elle pas être utilisée?

Il ne faut pas utiliser Ovestin Crème dans les situations suivantes:

- tumeur du sein ou de l'utérus ou autre tumeur hormono-dépendante, suspectée ou avérée,
- développement anormal de la muqueuse utérine (hyperplasie de l'endomètre)
- hémorragies vaginales de survenue récente, non élucidées et n'ayant pas fait l'objet d'un bilan médical,
- maladies circulatoires passées ou présentes telles que présence de caillots sanguins dans les veines des membres inférieurs ou dans les poumons,
- troubles de la coagulation sanguine (thrombophilie telle que déficit en protéine C, en protéine S ou en antithrombine),
- maladies passées ou présentes dues à la présence de caillots sanguins dans des artères, p. ex. angine de poitrine, accident vasculaire cérébral ou infarctus du myocarde,
- maladie hépatique passée ou présente, tant que le taux des paramètres biologiques hépatiques est augmenté,
- porphyrie (affection congénitale ou acquise concernant la production du pigment sanguin),
- hypersensibilité/intolérance à l'estriol ou à l'un des autres composants du médicament.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Ovestin Crème?



Le traitement hormonal substitutif (THS, abréviation utilisée ci-après) offre des avantages mais présente également quelques risques dont il faut tenir compte lorsque l'on décide d'instaurer ou de poursuivre un tel traitement.

Examens médicaux de contrôle

Avant que vous ne commenciez un THS, il faut que votre médecin relève soigneusement vos antécédents personnels et familiaux (c'est-à-dire les maladies survenues chez vous et dans votre famille). Votre médecin examinera vos seins et votre utérus et pratiquera un examen général et gynécologique approfondi.

Pendant le traitement hormonal substitutif, vous devez régulièrement consulter votre médecin (au moins une fois par an). À l'occasion de ces examens de contrôle, votre médecin déterminera si le traitement peut être poursuivi, compte tenu du bénéfice et des risques.

Certaines maladies peuvent s'aggraver pendant un THS. Si vous souffrez actuellement ou avez souffert par le passé de l'une des affections énumérées ci-après ou si l'une de ces affections s'est détériorée durant la grossesse ou lors d'un traitement hormonal précédent, vous devez signaler ce fait à votre médecin.

Il vous surveillera étroitement concernant: tumeurs de l'utérus, endométriose (développement de muqueuse utérine en dehors de l'utérus, ce qui provoque des douleurs et des hémorragies), antécédents familiaux de tumeurs dépendantes des œstrogènes (p. ex. si un membre de votre famille a eu un cancer du sein), hyperplasie utérine (épaississement de la muqueuse), risque accru de troubles de la coagulation dans les veines (formation de caillots sanguins, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire), migraine ou maux de tête violents, hypertension artérielle, maladies cardiaques, diabète, troubles fonctionnels du foie, calculs biliaires, troubles fonctionnels des reins, lupus érythémateux (une maladie auto-immune de la peau), épilepsie, asthme et otosclérose (surdité congénitale de l'oreille moyenne) -œdème héréditaire ou acquis. Une surveillance étroite sera également nécessaire si vous souffrez de diabète.

Informez votre médecin en cas de modification de votre état pendant l'utilisation d'Ovestin Crème.

Situations qui exigent l'arrêt immédiat de l'utilisation d'Ovestin Crème:

- maladies thromboemboliques veineuses ou artérielles (formation de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins). Cela peut se manifester par des douleurs aux jambes, des douleurs thoraciques, de la toux, des difficultés à respirer (embolie pulmonaire), un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral.
- augmentation brusque de la tension artérielle,
- survenue d'une jaunisse (la peau devient jaune) ou détérioration de la fonction hépatique,
- gonflements du visage, de la langue et/ou de la gorge et/ou difficultés à avaler ou urticaire, associés à des problèmes respiratoires, qui laissent suggérer un angio-œdème,
- migraine ou céphalées inhabituellement fortes que vous n'aviez pas auparavant ou survenue plus fréquente de céphalées inhabituellement fortes,
- croissance de tumeurs bénignes de l'utérus (myomes),
- diminution de l'acuité visuelle,
- troubles soudains de l'ouïe,
- grossesse.



La plupart des risques mentionnés ici ont été observés avec des préparations de traitement hormonal substitutif (THS) qui agissent sur tout le corps, p. ex. pour le traitement des bouffées de chaleur. Le risque associé à l'emploi de préparations d'effet essentiellement local telles que la crème vaginale Ovestin Crème ou du principe actif estriol est moins bien connu. Une évaluation soigneuse des bénéfices et des risques et une surveillance médicale avant et pendant le traitement sont indispensables.

Maladies tumorales

Cancer de l'utérus

Une étude épidémiologique a montré que le traitement au long cours par l'estriol à faible dose peut augmenter le risque de cancer de l'endomètre, surtout lorsque l'estriol est pris sous forme de comprimés et, dans une moindre mesure, en application vaginale (ovule, crème). Ce risque a augmenté en fonction de la durée du traitement et diminué dans l'année suivant l'arrêt du traitement. Pour prévenir une stimulation de l'endomètre, il ne faut ni dépasser la dose maximale ni l'utiliser pendant plusieurs semaines.

Informez votre médecin si des hémorragies vaginales et des petites pertes sanglantes se produisent pendant ou après l'arrêt du traitement. Leur origine doit être élucidée, étant donné qu'elles peuvent être dues à un épaississement de l'utérus.

Cancer du sein

Les données disponibles montrent que l'utilisation d'un traitement hormonal substitutif (THS) augmente le risque de cancer du sein chez les femmes qui utilisent un THS pendant plus de 5 ans. Les femmes qui utilisent un traitement hormonal substitutif combiné (œstrogènes et progestatifs) présentent un risque légèrement plus élevé de cancer du sein que les femmes qui utilisent un traitement hormonal substitutif uniquement à base d'œstrogènes.

Après l'arrêt du THS, le risque supplémentaire diminue avec le temps, mais le risque peut durer 10 ans ou plus si vous avez utilisé le THS pendant plus de 5 ans. On ignore le risque spécifique associé à l'application vaginale d'Ovestin. Si vous présentez un risque accru de cancer du sein, vous devez discuter avec votre médecin du rapport bénéfice/risque d'un tel traitement.

Vous devez donc faire examiner vos seins par un médecin avant de commencer un traitement hormonal substitutif et ensuite tous les ans, et vous devez examiner vous-même vos seins tous les mois à la recherche d'anomalies telles que creux dans la peau, modifications des mamelons ou nodules visibles ou palpables. Si vous remarquez des changements au niveau de vos seins, contactez votre médecin.

Cancer des ovaires

Plusieurs études suggèrent qu'un traitement hormonal substitutif (que ce soit une monothérapie d'œstrogènes ou un traitement hormonal substitutif combiné) pourrait être associé à une légère augmentation du risque de développement d'un cancer de l'ovaire.

Tumeurs hépatiques

Dans de rares cas, des modifications bénignes et, plus rarement encore, des modifications malignes du foie ont été observées lors de l'utilisation d'hormones sexuelles, qui ont parfois entraîné des hémorragies internes potentiellement fatales. Veuillez immédiatement contacter votre médecin en cas d'apparition de fortes douleurs épigastriques.



Influence sur le cœur et la circulation

Le THS est déconseillé pour les femmes qui souffrent d'une maladie cardiaque ou qui en ont souffert récemment. Si vous avez des antécédents de maladie cardiaque, vous devez discuter avec votre médecin du rapport bénéfice/risque d'un THS.

Le THS ne contribue pas à prévenir les événements cardio-vasculaires.

Les femmes qui reçoivent un THS œstro-progestatif sont exposées à un risque légèrement accru d'affections cardiaques pendant la première année. Avec les autres THS, le risque est vraisemblablement similaire, bien que cela ne soit pas encore certain.

Si vous présentez des symptômes pouvant suggérer une affection cardiaque (comme des douleurs dans la poitrine irradiant dans le bras ou le cou), vous devez consulter votre médecin aussi rapidement que possible et arrêter le THS jusqu'à ce qu'il vous dise que vous pouvez le reprendre.

Caillots de sang

Un THS augmente le risque de formation de caillots dans les veines (que l'on appelle aussi «thrombose veineuse profonde») d'un facteur de 2 à 3, surtout pendant la première année de traitement. Les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires sont des exemples de maladies appartenant à la catégorie des thromboembolies veineuses. On ignore si cette augmentation du risque s'applique aussi à Ovestin.

Ces caillots de sang ne sont pas toujours graves mais s'ils migrent dans les poumons, ils peuvent provoquer des douleurs dans la poitrine, une détresse respiratoire, un collapsus et même la mort. Il s'agit alors d'une embolie pulmonaire.

Si vous présentez des symptômes qui pourraient indiquer la présence d'un caillot sanguin (comme un gonflement douloureux des jambes, des douleurs soudaines dans la poitrine et/ou une détresse respiratoire), vous devez consulter votre médecin aussi rapidement que possible et arrêter le THS jusqu'à ce qu'il vous dise que vous pouvez le reprendre.

Le risque de formation de caillots sanguins augmente avec l'âge ainsi que dans les cas suivants: si vous avez accouché récemment, si vous avez déjà eu une ou plusieurs fausses couches, si vous prenez des œstrogènes, si vous fumez, si vous présentez une surcharge pondérale importante, si vous avez des antécédents de troubles de la coagulation touchant les membres inférieurs, les poumons ou un autre organe et si des troubles de la coagulation se sont manifestés chez vos parents, votre sœur ou votre frère. Si vous prenez un traitement anticoagulant (médicament pour fluidifier le sang) à cause d'un trouble de la coagulation, ce sera à votre médecin de décider si vous pouvez utiliser Ovestin.

Le risque augmente également si vous ne pouvez pas marcher pendant une période prolongée à la suite d'une intervention chirurgicale majeure, d'une blessure ou d'une maladie, ainsi que si vous souffrez de cancer ou de lupus érythémateux (une maladie auto-immune de la peau).

Si une opération est prévue ou si vous ne pouvez plus marcher pendant quelque temps, vous devez en parler à votre médecin. Il se peut que vous deviez arrêter le THS 4 à 6 semaines avant l'intervention. Votre médecin vous dira quand vous pourrez le reprendre.

Si vous présentez un risque accru de formation de caillots sanguins, vous devez vous entretenir avec votre médecin sur le rapport bénéfice/risque d'un THS.

Sur 1000 femmes de 50 à 59 ans qui ne prennent pas de THS, le risque de développer un caillot sanguin dans une veine est en moyenne de 3 cas en l'espace de 5 ans. Sur 1000 femmes de 50 à 59 ans qui ont



reçu un THS œstro-progestatif pendant plus de 5 ans, on observe 2 à 6 cas supplémentaires de caillots sanguins.

Accident vasculaire cérébral

Un THS œstro-progestatif et aussi par œstrogènes seuls accroît le risque d'AVC jusqu'à 1,5 fois.

Si vous présentez des symptômes qui pourraient suggérer un accident vasculaire cérébral (comme des céphalées migraineuses inexplicables, avec ou sans troubles de l'acuité visuelle), vous devez consulter votre médecin aussi rapidement que possible et arrêter le THS jusqu'à ce qu'il vous dise que vous pouvez le reprendre.

Autres effets

Le risque de détérioration de la mémoire peut être accru chez les femmes qui commencent un THS œstro-progestatif après l'âge de 65 ans. Dans le cas d'œstrogènes en monothérapie, les études n'ont pas constaté de risque accru.

Informez votre médecin si vous prenez un traitement contre l'hypothyroïdie (insuffisance en hormones thyroïdiennes) parallèlement à votre traitement par Ovestin. Votre médecin surveillera alors régulièrement vos concentrations d'hormones thyroïdiennes.

La prise d'œstrogènes accroît le risque de maladies de la vésicule biliaire chez les femmes ménopausées. Si vous présentez des taux très élevés de lipides sanguins (triglycérides), il existe un risque de pancréatite ou d'autres complications, surtout si des taux élevés de lipides sanguins sont observés de façon importante dans votre famille.

Les œstrogènes peuvent provoquer ou aggraver un état appelé «angio-œdème», caractérisé par des gonflements soudains de la langue, du fond de la gorge, du visage, des yeux, des mains et des pieds.

Un THS peut provoquer différentes maladies de la peau, comme un chloasma (ou masque de grossesse), caractérisé par une pigmentation brunâtre de la peau, en particulier sur le visage ou le cou. Les femmes ayant des antécédents de chloasma ne doivent pas s'exposer aux rayons solaires.

Les risques décrits pour les THS dans la présente notice d'emballage ont été observés surtout lors du traitement de femmes âgées de plus de 50 ans. On ignore si les risques sont comparables chez les femmes qui ont une ménopause précoce (avant l'âge de 40 ans). Chez celles-ci, le médecin doit évaluer soigneusement si les avantages d'un THS prédominent par rapport aux risques.

On ignore si Ovestin Crème affecte l'attention ou la concentration et, par conséquent, l'aptitude à la conduite de véhicules ou à la manipulation de machines. Des troubles visuels et des états de vertige ont cependant été décrits sous THS. Il faut en tenir compte lors de la conduite d'un véhicule ou de la commande d'une machine.

Utilisation d'autres médicaments

D'autres médicaments peuvent modifier les effets d'Ovestin, de même qu'Ovestin peut modifier les effets d'autres médicaments. Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez d'autres médicaments ou si vous avez l'intention de prendre d'autres médicaments, par exemple

- médicaments contre l'épilepsie (p. ex. lamotrigine, barbituriques, hydantoïne et carbamazépine),
- médicaments contre les infections (p. ex. griséofulvine, rifamycine),
- médicaments contre les infections virales (p. ex. névirapine, éfavirenz, ritonavir, nelfinavir, cobicistat),



- médicaments phytothérapeutiques contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*),
- médicaments psychoactifs (benzodiazépines), immunosuppresseur (cyclosporine), théophylline (médicament contre l'asthme).

Si vous prenez un antiépileptique appelé lamotrigine, veuillez le dire à votre médecin. En effet, une adaptation de la dose de lamotrigine administrée pourrait être nécessaire. De plus, vous devrez faire l'objet d'une étroite surveillance au début du traitement par Ovestin. Si vous voulez de nouveau arrêter Ovestin, cela doit aussi se faire sous la surveillance de votre médecin, car une adaptation de la dose de lamotrigine pourrait encore être nécessaire.

Veuillez informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments pour le traitement d'une infection par le virus de l'hépatite C (p. ex. médicaments contenant des principes actifs tels que l'ombitasvir, le paritaprévir, le ritonavir, le dasabuvir, le glécaprévir / le pibrentasvir; le sofosbuvir / le velpatasvir / le voxilaprévir), car les œstrogènes comme Ovestin peuvent altérer les effets de ces médicaments.

Le traitement combiné par ombitasvir/paritaprévir/ritonavir avec ou sans dasabuvir, ainsi que le traitement par glécaprévir/pibrentasvir contre le virus de l'hépatite C (VHC) peuvent provoquer une augmentation des valeurs hépatiques lors des examens sanguins (augmentation de l'enzyme hépatique ALAT) chez les femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux combinés contenant de l'éthinylestradiol. On ne sait pas si une augmentation de l'enzyme hépatique ALAT peut survenir lors de l'utilisation concomitante d'Ovestin et de ce traitement combiné contre le VHC. Votre médecin pourra vous conseiller à ce sujet.

Excipients

Ovestin Crème contient de l'alcool cétylstéarylique, ce qui peut provoquer des réactions cutanées localisées (p. ex. dermatite de contact).

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique ou
- vous prenez d'autres médicaments ou utilisez d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Ovestin Crème peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou pendant l'allaitement?

Ovestin n'est pas indiquée pendant la grossesse et l'allaitement; il n'y a d'ailleurs pas lieu d'utiliser la crème vaginale Ovestin Crème durant la grossesse ou l'allaitement.

Comment utiliser Ovestin Crème?


Pour les symptômes vaginaux, la posologie usuelle est de 1 dose d'applicateur par jour pendant les deux à trois premières semaines; ensuite, réduire progressivement la dose, p. ex. 1 dose d'applicateur deux fois par semaine. Pour les autres troubles, le médecin peut vous prescrire une posologie différente. Si votre médecin vous prescrit plus que le contenu de 1 applicateur par jour, il vous prescrira, le cas échéant, aussi un autre médicament appelé progestatif. Il est conseillé d'introduire la crème vaginale dans le vagin à l'aide




de l'applicateur, avant le coucher.

1 dose d'applicateur (applicateur rempli jusqu'à l'anneau qui sert de repère) contient 0,5 g d'Ovestin Crème, soit 0,5 mg d'estriol.


1. Retirer le bouchon du tube, le retourner et ouvrir le tube avec l'extrémité pointue.
2. Visser l'extrémité de l'applicateur sur le tube.



3. Appuyer sur le tube afin de remplir l'applicateur d'Ovestin Crème jusqu'à ce que le piston bute.



4. Dévisser l'applicateur du tube et refermer le tube avec le bouchon.
5. Introduire l'extrémité de l'applicateur jusqu'au fond du vagin et vider l'applicateur en appuyant lentement sur le piston.



6. Après l'emploi, retirer le piston de l'applicateur; nettoyer les deux parties à l'eau chaude savonneuse (pas d'eau bouillante) et, ensuite, rincer soigneusement. Ne pas utiliser de détergents.

Ovestin Crème n'est pas indiquée pour une utilisation chez l'enfant et l'adolescent.

Ne modifiez pas de votre propre chef la posologie prescrite. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'effet du médicament est trop faible ou, au contraire, trop fort.

Que faire si vous avez oublié une dose?



Si vous constatez l'oubli d'une dose, rattrapez-la immédiatement, sauf si vous ne constatez cet oubli que le jour où vous devriez utiliser la dose suivante. Si tel est le cas, vous ne devez pas utiliser la dose oubliée mais poursuivre le traitement avec Ovestin Crème comme d'habitude.

Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.

Que faire si vous avez utilisé trop d'Ovestin Crème?

Si vous avez utilisé plus d'Ovestin Crème que vous n'auriez dû, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si quelqu'un a avalé un peu de crème, il n'y a pas lieu de beaucoup s'inquiéter. Il faut néanmoins consulter le médecin. Des nausées et des vomissements peuvent éventuellement survenir, et une hémorragie vaginale peut se produire au bout de quelques jours.

Quels effets secondaires Ovestin Crème peut-elle provoquer?

Les effets secondaires les plus graves associés à l'utilisation d'un THS sont décrits dans la rubrique «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Ovestin Crème?».

Des irritations locales ou des démangeaisons sont possibles au début du traitement.

Les effets secondaires suivants ont été rapportés sous Ovestin ou sous d'autres THS (essentiellement œstro-progestatifs):

- maladies cancéreuses telles que prolifération anormale ou cancer de la muqueuse utérine (hyperplasie ou cancer de l'endomètre) ou cancer ovarien
- troubles du système immunitaire tels que réactions d'hypersensibilité
- troubles du métabolisme et de la nutrition tels qu'appétit accru, prise de poids
- troubles psychiatriques tels que modifications de la libido, fluctuations d'humeur, dépression ou démence
- troubles du système nerveux tels que maux de tête, vertiges, troubles du sommeil ou aggravation d'une migraine
- troubles oculaires tels que problèmes visuels
- troubles cardiaques et vasculaires tels que phlébite, hypertension, caillots sanguins dans les veines des jambes ou des poumons (thromboembolie veineuse), accident vasculaire cérébral ou infarctus du myocarde
- troubles gastro-intestinaux tels que ballonnements, douleurs abdominales, nausées, vomissements ou diarrhées
- troubles hépatobiliaires tels qu'insuffisance hépatique, jaunisse ou calculs biliaires
- troubles cutanés et des tissus sous-cutanés tels qu'éruption cutanée, démangeaisons, chute des cheveux, pilosité excessive, taches brunâtres sur la peau (chloasma) ou urticaire, angio-œdème (fréquence inconnue)
- troubles musculosquelettiques tels que crampes musculaires
- affections des reins et des voies urinaires: problèmes/troubles lors de la miction (dysurie)
- symptômes pseudo-grippaux
- troubles des organes de reproduction et des seins tels que sensibilité accrue ou douleurs des seins, gonflement des seins, écoulement vaginal anormal, douleurs du bas-ventre, saignements vaginaux et saignements intermenstruels, modification de la glaire cervicale, sécrétions des mamelons ou tumeurs bénignes en zone génitale, douleur, sensation de brûlure, irritation, démangeaisons dans la



zone génitale

- troubles généraux tels que rétention d'eau dans les tissus, se manifestant généralement par un gonflement des chevilles ou des pieds

Chez la plupart des patientes, ces effets secondaires disparaissent au cours des premières semaines du traitement. Prévenez votre médecin si des hémorragies vaginales surviennent ou si un effet secondaire quelconque persiste.

Pour de plus amples informations, voir «Quand Ovestin Crème ne doit-elle pas être utilisée?» et «Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Ovestin Crème?».

Si vous remarquez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cela s'applique en particulier aux effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Ne pas conserver au-dessus de 25 °C.

Ne pas congeler.

Conserver hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Ovestin Crème?

Principes actifs

1 g de crème vaginale Ovestin Crème contient 1 mg de principe actif (estriol).

Excipients

Octyldodécanol, palmitate de cétyle, glycérol (E 422), alcool cétylique, alcool stéarylique, polysorbate 60, monostéarate de sorbitane, acide lactique, chlorhydrate de chlorhexidine, hydroxyde de sodium et eau purifiée.

Ovestin Crème est une masse pas tout à fait blanche, crémeuse, homogène, molle et conditionnée en tubes d'aluminium pliables.

Un applicateur est joint à chaque tube.

Numéro d'autorisation

50844 (Swissmedic)

Où obtenez-vous Ovestin Crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale.

Tubes de 15 g de crème.



Titulaire de l'autorisation

Aspen Pharma Schweiz GmbH, Baar.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en novembre 2025 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

DOC-22-01-2026

