

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Arnica, pastiglie

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Arnica*?

Secondo il quadro sindromico della farmacopea omeopatica, *SIMILASAN Arnica* può essere impiegato in caso di lesioni dolorose e sensibili al tocco e loro conseguenze, quali: slogature, distorsioni, ammacature, contusioni; ematomi e dolori dei tessuti; ferite e relativi dolori, ustioni; dolori e spossatezza a seguito di sovraffaticamento fisico; dolori articolari, muscolari, tendinei, delle borse sinoviali, delle guaine tendinee; indolenzimento.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

- Le ferite estese, molto contaminate e profonde, come anche i morsi e le ferite da punta richiedono un trattamento medico (pericolo di tetano). Rivolgersi, inoltre, al medico se le dimensioni della ferita tendono a non ridursi o se la ferita non si rimargina nel giro di 7 giorni. Lo stesso vale se il margine della ferita sono molto arrossati, o la ferita comincia improvvisamente a gonfiarsi e a far molto male o se compare febbre pericolo di setticemia.
- Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può assumere *SIMILASAN Arnica*.
- In caso di continuo peggioramento o mancata guarigione consultare un medico.

Quando non si può assumere *SIMILASAN Arnica* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

SIMILASAN Arnica non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Se sa di essere intollerante agli zuccheri, assuma *SIMILASAN Arnica* solo dopo aver consultato il suo medico.

Questo medicamento contiene 241,25 mg di lattosio (1,0158 g/2 g di glucosio e 1,0158 g/2 g di galattosio) per dose. Ciò è da tenere in considerazione nelle persone affette da diabete mellito.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere *SIMILASAN Arnica* durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

Come usare *SIMILASAN Arnica*?

Salvo diversa prescrizione medica, attenersi alla seguente posologia: Adulti e bambini:

1 compressa per ogni somministrazione.

- **Disturbi acuti:** Frequentemente (fino ad ogni quarto d'ora). In caso di sensibile miglioramento, ridurre la dose a propria discrezione.
- **Dopo il miglioramento:** 2 - 3 volte al giorno fino a sparizione dei sintomi.
- **Dose giornaliera massima:** 12 compresse al giorno

SIMILASAN Arnica non deve essere usato nei bambini di età inferiore a 2 anni.

Avvertenze per l'assunzione:

- Le pastiglie *non* vanno inghiottite intere, ma masticate o lasciate sciogliere lentamente in bocca.
- Per prendere la pastiglia eventualmente scioglierla in un po d'acqua.
- Può essere somministrato anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Arnica*?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Arnica* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *SIMILASAN Arnica*.

Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.*

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).



Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Arnica*?

1 compressa da 250 mg contiene:

Principi attivi

Arnica montana (HAB) D12 / D15 / D30 in parti uguali 8,33 mg.

Sostanze ausiliarie

Lattosio 241,25 mg, amido di mais e stearato di magnesio.

Numero dell'omologazione

56388 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Arnica*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione: 60 pastiglie

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

