

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Angina MCC®

Streuli Pharma AG

Che cos'è Angina MCC e quando si usa?

Le pastiglie Angina MCC contengono una combinazione di cetilpiridinio, lidocaina e levomentolo.

Mentre il cetilpiridinio agisce contro i germi, la lidocaina elimina i dolori della mucosa della cavità orale, della faringe e della laringe, alleviando così le difficoltà di deglutizione.

Il levomentolo conferisce alle pastiglie un gradevole sapore.

Angina MCC viene usato in caso di infezioni o infiammazioni in bocca e/o nella cavità della faringe (angina, infiammazione della laringe-faringe) così come nelle malattie della bocca e/o della mucosa della faringe (afte, stomatite).

Angina MCC può anche essere usato dopo un'operazione alle tonsille o dopo la perdita di un dente.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Indicazione per i diabetici: 1 pastiglia contiene 0.5 g di carboidrati digeribili, il medicamento è adatto anche ai diabetici.

Quando non si può assumere/usare Angina MCC?

Angina MCC non si può usare in caso di ipersensibilità ad uno dei componenti del medicamento.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Angina MCC?

In caso di ferite sanguinanti in bocca o nella cavità della faringe, si dovrebbe prendere le pastiglie con prudenza – se non può farne a meno.

In caso di febbre alta o se entro 1 settimana non ci fossero dei miglioramenti, consultare un medico.

Questo medicamento contiene mannitolo e xilitolo, può avere un leggero effetto lassativo. Lo xilitolo ha un valore calorico di 2,4 kcal/g.

Questo medicamento contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per pastiglia, è cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o usa altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa !).

Si può assumere/usare Angina MCC durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state condotte indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Angina MCC?

Adulti e bambini sopra i 6 anni:



Far sciogliere lentamente in bocca 1 pastiglia ogni ora. Dopo la scomparsa dei sintomi acuti e come profilassi, succhiare una pastiglia ogni 3–4 ore. Le pastiglie presentano una scanalatura decorativa lungo la quale non è possibile dividerle.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Angina MCC?

Con l'assunzione di Angina MCC possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali: L'uso eccessivo o prolungato di Angina MCC può causare irritazioni locali. In caso di ferite fresche in bocca, sussiste il pericolo di emorragie.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazioni concernenti l'immagazzinamento

Conservare alla temperatura ambiente (15–25°C).

Conservare il medicamento fuori della portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Restituite i medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, presso un punto di dispensazione (farmacie, drogherie, studio medico) o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Il medico, il farmacista o il droghiere che sono in possesso di documentazione professionale, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Angina MCC?

Principi attivi

1 pastiglia contiene 1,25 mg di cloruro di cetilpiridinio (corrispondenti a 1,1 mg di cetilpiridinio), 1,0 mg di cloruro di lidocaina monoidrato (corrispondenti a 0,8 mg di lidocaina), 4,0 mg di levomentolo.

Sostanze ausiliarie

1 pastiglia contiene saccarina sodica (E954), ciclamato di sodio (E952), mannitolo (E421), xilitolo (E967), gomma arabica (E414), gelatina (E441), acido citrico monoidrato (E330), cloruro di metiltionina, biossido di silicio altamente disperso (E551), stearato di magnesio (E572), olio di ricino idrogenato.

Numero dell'omologazione

34497 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Angina MCC? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 30 o 50 pastiglie con scanalatura decorativa.

Titolare dell'omologazione

Streuli Pharma SA, Uznach

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

