

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

ASS Cardio Spirig HC® compresse rivestite con film

Spirig HealthCare AG

Che cos'è ASS Cardio Spirig HC e quando si usa?

ASS Cardio Spirig HC contiene il principio attivo acido acetilsalicilico che, già in piccole quantità, inibisce l'aggregazione delle piastrine. Grazie ad un rivestimento resistente ai succhi gastrici la compressa si scioglie solo nell'intestino. In questo modo ASS Cardio Spirig HC salvaguarda la mucosa gastrica.

ASS Cardio Spirig HC deve essere usato solo su prescrizione medica.

ASS Cardio Spirig HC serve per:

- la prevenzione di trombosi arteriose dopo operazioni ai vasi coronarici (bypass ed eliminazione di una stenosi dei vasi coronarici).
- prevenire colpi apoplettici, inseguito alla comparsa di fenomeni precursori (attacchi ischemici transitori, TIA).
- la prevenzione di trombosi arteriose (grumi di sangue nelle coronarie) dopo un infarto cardiaco (profilassi della ripetizione dell'infarto).
- la prevenzione per pazienti con alto rischio d'infarto del miocardio accertato dal medico. Devono essere contemporaneamente trattate le malattie concomitanti come l'ipertensione, il diabete e valori elevati dei lipidi nel sangue. Si deve inoltre smettere di fumare.
- il trattamento dell'angina pectoris instabile.
- il trattamento dell'infarto cardiaco acuto.
- la prevenzione di trombosi arteriose dopo operazioni sui vasi sanguigni.
- la prevenzione di un peggioramento in caso di malattia occlusiva delle arterie.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

ASS Cardio Spirig HC non deve essere usato per un periodo prolungato o in dosi elevate senza chiedere il parere del medico.

Quando non si può assumere ASS Cardio Spirig HC?

Nei seguenti casi non deve assumere ASS Cardio Spirig HC:

- Se ha una reazione allergica a uno dei componenti o se dopo l'assunzione di acido acetilsalicilico o di altri medicinali contro il dolore o i reumatismi, i cosiddetti medicinali antinfiammatori non steroidei, ha avuto difficoltà respiratorie o reazioni cutanee simili a quelle delle allergie;
- Se soffre di ulcera gastrica e/o duodenale attiva o se presenta sanguinamenti gastrointestinali;
- In caso di malattie infiammatorie croniche (morbo di Crohn, colite ulcerosa);
- Se mostra una predisposizione ai sanguinamenti patologicamente alta;
- In caso di grave limitazione della funzionalità epatica e renale;
- In caso di grave insufficienza cardiaca;
- Se deve assumere contemporaneamente metotrexato a una dose superiore a 15 mg alla settimana;
- Negli ultimi 3 mesi di gravidanza;



- Per il trattamento del dolore dopo un intervento di bypass coronarico sul cuore (o impiego di una macchina cuore-polmone).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di ASS Cardio Spirig HC?

Durante il trattamento con ASS Cardio Spirig HC possono comparire, nel tratto gastrointestinale superiore, ulcere della membrana mucosa, in casi rari emorragie o in casi singoli perforazioni (fori nello stomaco/nell'intestino). Queste complicazioni possono manifestarsi in qualsiasi momento durante il trattamento anche senza alcun preavviso. Per ridurre questo rischio, il suo medico le prescriverà la più piccola dose efficace per il più breve tempo possibile. Consulti il suo medico se ha dolori di stomaco o se ritiene che ci sia una relazione con l'assunzione del medicamento.

L'assunzione di ASS Cardio Spirig HC può danneggiare la funzionalità dei suoi reni, il che può avere come conseguenza un aumento della pressione arteriosa e/o accumuli di liquidi (edemi). Informi il suo medico se è affetto da una malattia cardiaca o renale, se assume medicinali contro l'ipertensione arteriosa (ad es. diuretici, ACE-inibitori) o in caso di aumentata perdita di liquidi, ad es. a causa di forte sudorazione.

Con l'uso di antinfiammatori non steroidei (FANS), compresa anche ASS Cardio Spirig HC, è stata segnalata una reazione allergica potenzialmente grave nota come sindrome di Kounis. Oltre alle reazioni allergiche (come eruzioni cutanee, respiro corto), la sindrome di Kounis può manifestarsi con dolori al petto.

L'assunzione deve avvenire solo in caso di asma, orticaria, di polipi nasali, di raffreddore del fieno o altre allergie, di una rara malattia ereditaria dei globuli rossi conosciuta con il nome di «carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi», come anche in caso di trattamento con sostanze che riducono la coagulabilità del sangue (che «diluiscano» il sangue, anticoagulanti) o di sostanze che riducono la pressione arteriosa (antipertensivi).

ASS Cardio Spirig HC non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Bambini e ragazzi con febbre, influenza, varicella o altre malattie virali devono assumere ASS Cardio Spirig HC esclusivamente su indicazione del medico e come rimedio di seconda scelta. Se nel corso di queste malattie oppure alla loro risoluzione dovessero insorgere disturbi della conoscenza accompagnati da vomito, si raccomanda di consultare immediatamente il medico.

L'assunzione concomitante di ASS Cardio Spirig HC e antidiabetici (ad es. insulina, sulfaniluree) può ridurre i livelli di zucchero nel sangue.

Consulti il suo medico se, contemporaneamente ad ASS Cardio Spirig HC, assume un antidolorifico e antinfiammatorio (come, p.es., i principi attivi ibuprofene o naprossene), perché queste sostanze possono ridurre l'effetto di ASS Cardio Spirig HC.

Il metamizolo (sostanza usata per ridurre dolore e febbre) può diminuire l'effetto dell'acido acetilsalicilico sull'aggregazione piastrinica (cellule del sangue che si attaccano e formano un coagulo di sangue), se assunto contemporaneamente. Pertanto, questa combinazione deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono aspirina a basse dosi per la cardioprotezione.

L'attività dei preparati antigottosi (probenecid e sulfinpirazone), dei medicinali che stimolano l'eliminazione di urina (diuretici) e dei medicinali antiipertensivi può risultarne diminuita. In caso di somministrazione concomitante, possono risultare accentuati gli effetti indesiderati di antireumatici o del metotrexato (somministrato ad es. nella poliartrite cronica; ved. anche la rubrica «Quando non si può assumere ASS Cardio Spirig HC?»).

La somministrazione contemporanea di ASS Cardio Spirig HC, soprattutto in caso di terapia protratta, può potenziare l'attività dei farmaci cortisonici, dei farmaci anticonvulsivanti (antiepilettici), anticoagulanti, diossina e preparati ai sali di litio contro la depressione può risultare potenziata e causare quindi un aumento degli effetti indesiderati di questi medicinali.

ASS Cardio Spirig HC può aumentare il rischio di emorragie se assunta in concomitanza a preparati cortisonici, alcol o farmaci del gruppo dei cosiddetti inibitori della ricaptazione della serotonina contro la depressione. L'assunzione contemporanea di ASS Cardio Spirig HC e preparati cortisonici o alcol può aumentare il rischio di ulcere gastrointestinali.



La tendenza all'emorragia può aumentare anche inseguito a piccole operazioni chirurgiche come ad esempio l'estrazione di un dente.

L'acido acetilsalicilico, anche a basse dosi, riduce l'eliminazione dell'acido urico. Ciò può scatenare un attacco di gotta nei pazienti che già in precedenza presentavano una ridotta escrezione dell'acido urico.

1 compressa rivestita contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg), cioè essenzialmente «senza sodio».

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa!).

Si deve consultare o informare il medico o il dentista riguardo alla somministrazione prima di interventi chirurgici.

Si può usare ASS Cardio Spirig HC durante la gravidanza o l'allattamento?

Gravidanza

Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza.

Se è in corso una gravidanza o se sta pianificando una gravidanza, deve usare ASS Cardio Spirig HC solo dopo aver consultato il suo medico. Se, su indicazione del medico, dovesse continuare o intraprendere un trattamento con ASS Cardio Spirig HC durante la gravidanza, questo deve avvenire solo seguendo attentamente le indicazioni e solo durante i primi 6 mesi di gravidanza. Durante gli ultimi 3 mesi di gravidanza non deve assumere ASS Cardio Spirig HC, in quanto può mettere in pericolo il nascituro e esiste il pericolo di emorragie e di un possibile ritardo del termine del parto.

Con l'assunzione di ASS Cardio Spirig HC a partire dalla 20° settimana di gravidanza può verificarsi un restringimento di un vaso sanguigno (Ductus arteriosus) nel nascituro. Se assume ASS Cardio Spirig HC, il suo medico potrà consigliarle un monitoraggio supplementare.

Allattamento

ASS Cardio Spirig HC non deve essere assunto durante l'allattamento, tranne se espressamente consentito dal medico.

Come usare ASS Cardio Spirig HC?

Salvo diversa prescrizione medica:

Prevenzione di trombosi arteriose senza operazione chirurgica bypass alle coronarie e dopo dilatazione mediante pallone di un vaso coronario ristretto: 100 mg al giorno.

Prevenzione di trombosi arteriose dopo operazione chirurgica bypass alle coronarie e dopo dilatazione mediante pallone di un vaso coronario ristretto: 100–300 mg al giorno.

Prevenzione di colpi apoplettici: 3× 100 mg al giorno oppure 1× 300 mg al giorno.

Prevenzione di trombosi dopo infarto cardiaco e trattamento dell'angina pectoris instabile: 1× 100 mg al giorno.

Prevenzione dell'infarto cardiaco in pazienti con alto rischio accertato dal medico: 1× 100 mg al giorno

Prevenzione di un peggioramento in caso di malattia occlusiva delle arterie: 1× 100 mg al giorno

Si consiglia di assumere le compresse con un po' di liquido, almeno mezz'ora prima del pasto. Subito dopo, bere da ½ a 1 bicchiere circa di liquido. Le compresse non devono essere schiacciate, rotte o masticate.

In caso di infarto cardiaco acuto: Alla comparsa di un infarto cardiaco acuto, in ospedale le saranno somministrati 200-300 mg di acido acetilsalicilico per via endovenosa. In alternativa, le potrà essere somministrato un preparato a base di acido acetilsalicilico ad assorbimento rapido (forma non gastroresistente), che può assumere per via orale, schiacciandolo o masticandolo, per ottenere un rapido



assorbimento del principio attivo. A partire dal secondo giorno, la posologia è di 100 mg di ASS Cardio Spirig HC al giorno.

Sarà il medico curante a decidere la posologia e la durata del trattamento.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

In caso di assunzione incontrollata (sovradosaggio), consulti immediatamente un medico. Segni riferibili al sovradosaggio possono essere la comparsa di ronzio auricolare e/o attacchi di sudorazione.

ASS Cardio Spirig HC non è raccomandato nei bambini e negli adolescenti sotto i 18 anni.

Quali effetti collaterali può avere ASS Cardio Spirig HC?

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Frequentemente gli effetti collaterali si possono manifestare sotto forma di disturbi di stomaco.

Non comune (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

Occasionalmente sono segnalati asma, problemi di digestione, nausea, vomito e diarrea.

Raro (riguarda da 1 a 10 persone su 10 000)

Raramente si possono verificare reazioni di ipersensibilità (come i gonfiore della cute e delle mucose (ad es. congestione nasale), eruzioni cutanee, calo della pressione sanguigna fino allo shock) ed anche emorragie ed ulcere gastrointestinali, che molto raramente possono sfociare in perforazioni.

In rari casi si possono comparire mal di testa, vertigini, ronzio alle orecchie, disturbi della vista, sordità, e stati confusionali, anemia da carenza di ferro ed anche disfunzioni renali ed epatiche.

In casi rari o molto rari sono state segnalate emorragie gravi, in particolare in pazienti con ipertensione non controllata e/o in trattamento concomitante con «medicamenti che diluiscono il sangue» (anticoagulanti), che in singoli casi possono essere potenzialmente pericolosi per la vita.

Molto raro (riguarda meno di 1 persona su 10 000)

In casi molto rari si possono manifestare severe reazioni cutanee, ipoglicemia, alterazioni dell'equilibrio acido-base e nei bambini la sindrome di Reye.

Sono stati segnalati ematomi, sanguinamento del naso e delle gengive, sanguinamento urogenitale e dopo interventi chirurgici. Un aumento del tempo di sanguinamento è possibile.

Frequenza non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

È stata riportata insufficienza renale acuta (improvvisa).

Sono stati riportati cambiamenti della parete intestinale, soprattutto dopo l'uso prolungato.

Se si dovessero manifestare segni di una reazione di ipersensibilità, il trattamento va interrotto e occorre consultare il medico.

È stata segnalata la sindrome di Kounis (dolore toracico associato a reazioni allergiche gravi).

Se durante il trattamento si dovesse notare una colorazione nera delle feci o un'emissione di sangue con il vomito, occorre interrompere immediatamente l'assunzione del medicamento e consultare il medico.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini.



Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene ASS Cardio Spirig HC?

1 compressa rivestita con film ASS Cardio Spirig HC 100 con il rivestimento resistente ai succhi gastrici contiene

Principi attivi

100 mg di acido acetilsalicilico.

Sostanze ausiliarie

Cellulosa microcristallina, amido di mais, acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1), talco, trietile citrato, silice colloidale anidra, acido stearico, polisorbato 80, sodio laurilsolfato.

Numero dell'omologazione

66097 (Swissmedic).

Dove è ottenibile ASS Cardio Spirig HC? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, solo dietro presentazione della prescrizione medica.

ASS Cardio Spirig HC 100 mg: confezione blister con 30, 60, 100 e 120 compresse rivestite con film.

ASS Cardio Spirig HC 100 mg: bottiglie di plastica con 100 compresse rivestite con film.

Titolare dell'omologazione

Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2026 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

