

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, Apothekers oder Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Iberogast® Magen, Tropfen zum Einnehmen

Bayer (Schweiz) AG

Pflanzliches Arzneimittel

Was ist Iberogast Magen und wann wird es angewendet?

Iberogast Magen ist ein pflanzliches Arzneimittel, das alkoholische Auszüge aus der frischen Bitteren Schleifenblume, aus Kamillenblüten, Kümmelfrüchten, Melissenblättern, Pfefferminzblättern und aus Süssholzwurzeln enthält. Die enthaltenen Pflanzenauszüge wirken krampflösend und beruhigend bei gereizter Magenschleimhaut.

Iberogast Magen wird bei Erwachsenen bei Oberbauchbeschwerden wie zum Beispiel Magenbeschwerden, Völlegefühl, Sodbrennen oder leichten Krämpfen angewendet.

Auf ärztliche Verschreibung wird das Arzneimittel auch bei Reizmagen (funktioneller Dyspepsie) mit Bauchkrämpfen, Bauchschmerzen und Magenschmerzen eingesetzt.

Was sollte dazu beachtet werden?

Magenbeschwerden, die sich als Schmerz oder Druckschmerz äussern oder mit einem allgemeinen Krankheitsgefühl verbunden sind, bedürfen der ärztlichen Abklärung.

Wenn sich die Beschwerden trotz Anwendung von Iberogast Magen nicht bessern, sollte nach spätestens 7 Tagen ein Arzt resp. Ärztin aufgesucht werden.

Sollten sich die Beschwerden unter der Einnahme von Iberogast Magen verschlimmern oder neue Beschwerden hinzukommen, ist grundsätzlich ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen. Gewisse Genussmittel wie Kaffee, Alkohol, Nikotin sowie gewisse Arzneimittel wie Schmerz- und Rheumamittel können Magenbeschwerden verursachen.

Wann darf Iberogast Magen nicht oder nur mit Vorsicht eingenommen werden?

Iberogast Magen darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe.

Die Symptome von Reizmagen wie Sodbrennen, Völlegefühl, Bauchkrämpfe, Bauchschmerzen und Magenschmerzen können auch auf organische Krankheiten hindeuten. Beim Auftreten derartiger Beschwerden oder einer Verschlechterung der bestehenden Beschwerden sollte ein Arzt bzw. eine Ärztin aufgesucht werden.

Bei schweren Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes darf Iberogast Magen nur auf Anweisung des Arztes bzw. der Ärztin angewendet werden.

Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Dieses Arzneimittel enthält 248 mg Alkohol (Ethanol) pro 20 Tropfen / 1 ml. Die Menge in 20 Tropfen / 1 ml dieses Arzneimittels entspricht weniger als 0.16 ml Bier oder 0.40 ml Wein. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen. Iberogast Magen enthält 31 Vol.-% Alkohol. Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit oder die Fähigkeit Maschinen zu bedienen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,



- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbst gekaufte!) einnehmen!

Darf Iberogast Magen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Iberogast Magen darf von Schwangeren und Stillenden nicht eingenommen werden.

Wie verwenden Sie Iberogast Magen?

1. Den weissen Deckel entfernen und entsorgen.	2. Fest aufschrauben, so dass der Tropfaufsatz fest sitzt.	3. Sicherstellen, dass der Tropfaufsatz dicht sitzt.

Vor Gebrauch schütteln.

Soweit nicht anders verschrieben, nehmen Erwachsene ab 18 Jahren 3-mal täglich 20 Tropfen Iberogast Magen vor oder zu den Mahlzeiten in etwas Flüssigkeit ein. Die Flasche muss beim Tropfen schräg gehalten werden.

1 ml = 20 Tropfen.

Die Anwendung und Sicherheit von Iberogast Magen bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist bisher nicht geprüft worden.

Wenn sich die Beschwerden trotz Anwendung von Iberogast Magen nicht bessern, sollte spätestens nach 7 Tagen ein Arzt resp. Ärztin aufgesucht werden.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt bzw. von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen kann Iberogast Magen haben?

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Iberogast Magen auftreten:

nicht bekannt (kann aus den verfügbaren Daten nicht abgeschätzt werden: Überempfindlichkeitsreaktionen (wie z.B. Atemnot oder Hautreaktionen wie Juckreiz oder Ausschlag oder Kreislaufstörungen).

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Dies gilt insbesondere auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Was ist ferner zu beachten?

Haltbarkeit

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.



Aufbrauchfrist nach Anbruch

Nach dem ersten Öffnen nicht länger als 8 Wochen verwenden.

Lagerungshinweis

Bei Raumtemperatur (15-25°C) lagern. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Hinweise

Sollte Iberogast Magen Ausflockungen oder Trübungen aufweisen, sind diese ohne Einfluss auf die Wirksamkeit des Arzneimittels.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Diese Personen verfügen über die ausführliche Fachinformation.

Was ist in Iberogast Magen enthalten?

1 ml Flüssigkeit enthält:

Wirkstoffe

- 0.15 ml Flüssigextrakt aus der ganzen frischen Pflanze der Bitteren Schleifenblume (*Iberis amara* L.; planta tota), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:1.5-2.5; Auszugsmittel; Ethanol 50% (V/V);
- 0.3 ml Flüssigextrakt aus Kamillenblüten (*Matricaria recutita* L.; flos), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2-4, Auszugsmittel: Ethanol 30% (V/V),
- 0.2 ml Flüssigextrakt aus Kümmelfrüchten (*Carum carvi* L.; fructus), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2.5-3.5, Auszugsmittel: Ethanol 30% (V/V),
- 0.15 ml Flüssigextrakt aus Melissenblättern (*Melissa officinalis* L.; folium), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2.5-3.5, Auszugsmittel: Ethanol 30% (V/V),
- 0.1 ml Flüssigextrakt aus Pfefferminzblättern (*Mentha x piperita* L.; folium), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2.5-3.5 Auszugsmittel: Ethanol 30% (V/V),
- 0.1 ml Flüssigextrakt aus Süssholzwurzeln (*Glycyrrhiza glabra* L., *Glycyrrhiza inflata* Batalin und / oder *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.; radix), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:2.5-3.5, Auszugsmittel: Ethanol 30% (V/V).

Hilfsstoffe

Keine

1 ml entspricht 20 Tropfen.

Dieses Arzneimittel enthält 31 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer

69025 (Swissmedic).

Wo erhalten Sie Iberogast Magen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung. Tropfflaschen zu 20 ml, 50 ml und 100 ml.

ZulassungsinhaberIn

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich.

Diese Packungsbeilage wurde im August 2023 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

