

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser ce médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Dalacin® T

Pfizer AG

Qu'est-ce que Dalacin T et quand doit-il être utilisé?

Dalacin T contient l'antibiotique clindamycine. Dalacin T est utilisé pour le traitement de l'acné. Dalacin T agit contre les bactéries qui jouent un rôle important dans l'apparition de zones inflammatoires en cas d'acné.

Selon prescription du médecin.

Quand Dalacin T ne doit-il pas être utilisé?

Dalacin T ne doit pas être utilisé en présence d'une hypersensibilité connue à la clindamycine, à la lincomycine ou à un autre composant de la préparation; Dalacin T ne doit pas non plus être utilisé si vous avez présenté par le passé une inflammation du colon provoquée par un antibiotique (inflammation appelée colite liée à un antibiotique).

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Dalacin T?

Si de fortes diarrhées surviennent pendant le traitement (éventuellement associées à de la fièvre et à des crampes abdominales sévères pouvant s'accompagner d'une perte de sang et de glaire), arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin.

L'effet de Dalacin T peut être influencé par des médicaments contenant de l'érythromycine (un autre antibiotique).

Ce médicament contient 25 mg d'alcool cetostéarylique ainsi que 25 mg d'alcool isostéarylique pour 1 g d'émulsion, qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

Ce médicament contient 3 mg de parahydroxybenzoate de méthyle pour 1 g d'émulsion, qui peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage externe (même en automédication!).

Dalacin T peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser ce médicament. Vous ne devez utiliser Dalacin T pendant la grossesse que si votre médecin vous l'a prescrit expressément.

Dalacin T ne doit pas être utilisé pendant la période d'allaitement. Si un traitement par Dalacin T s'avère indispensable, l'allaitement doit être arrêté.

Comment utiliser Dalacin T?

Appliquez deux fois par jour une fine couche de Dalacin T sur les endroits atteints.

Dalacin T émulsion doit être agité avant chaque utilisation. Dalacin T émulsion s'applique directement.



L'utilisation et la sécurité de Dalacin T n'ont pas été établies à ce jour pour les enfants et les adolescents.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Dalacin T peut-il provoquer?

Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de l'utilisation de Dalacin T:

Très fréquent (concerne plus d'une personne sur 10)

Irritations de la peau (notamment sensation de brûlure, démangeaisons et peau qui pèle), peau sèche et urticaire.

Fréquent (concerne 1 à 10 personnes sur 100)

Troubles gastro-intestinaux, tels que nausées et diarrhées, ainsi qu'une peau grasse/huileuse (appelée séborrhée).

En outre, des douleurs abdominales, des douleurs aux yeux, des éruptions cutanées (dermatites de contact) et des inflammations des follicules pileux ont également été observées.

Si, pendant le traitement par Dalacin T, une forte diarrhée devait apparaître, vous devez arrêter le médicament et prendre immédiatement contact avec votre médecin.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

À quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l'emballage.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25 °C) et hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Dalacin T?

Principes actifs

1 g d'émulsion contient 10 mg de clindamycine sous forme de phosphate de clindamycine.

Excipients

Glycérine, sodium lauroyl sarcosinate, acide stéarique, stéarate de glycérine, alcool cetostéarylique et isostéarylique, eau, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218).

Numéro d'autorisation

48006 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Dalacin T? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Dalacin T émulsion cutanée: flacons de 60 ml.

Titulaire de l'autorisation

Pfizer AG, Zürich.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en septembre 2022 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).



