

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Dalacin® T

Pfizer AG

Che cos'è Dalacin T e quando si usa?

Dalacin T contiene l'antibiotico clindamicina. Dalacin T è impiegato per il trattamento dell'acne. Dalacin T agisce contro i batteri che svolgono un ruolo importante nella formazione di zone infiammate nell'acne.

Su prescrizione medica.

Quando non si può usare Dalacin T?

Dalacin T non deve essere usato in caso di ipersensibilità nota alla clindamicina, alla lincomicina o a un altro componente del preparato; Dalacin T non deve essere usato anche se in passato ha manifestato un'inflammatione dell'intestino crasso dovuta ad un antibiotico (cosiddetta colite associata ad antibiotici).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Dalacin T?

Se durante il trattamento manifesta forte diarrea (eventualmente con febbre e forti crampi addominali, che possono essere accompagnati da perdite di sangue e muco), interrompa il trattamento e consulti immediatamente il suo medico.

L'azione di Dalacin T può essere influenzata da medicinali contenenti eritromicina (un altro antibiotico).

Questo medicamento contiene per 1 g di emulsione 25 mg di alcol cetostearilico e 25 mg di alcol isostearilico, che possono causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Questo medicamento contiene per 1 g di emulsione 3 mg di metilidrossi benzoato, che può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Informi il suo medico o il suo farmacista, nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Dalacin T durante la gravidanza o l'allattamento?

Se è incinta o sta allattando, oppure se sospetta di essere incinta o sta pianificando una gravidanza, chiedi consiglio al suo medico prima di usare questo medicamento. Durante la gravidanza Dalacin T deve essere usato solo se espressamente prescritto dal medico.

Dalacin T non deve essere usato durante l'allattamento. Qualora il trattamento con Dalacin T durante l'allattamento sia indispensabile, si deve smettere di allattare.

Come usare Dalacin T?

Applicare due volte al giorno uno strato sottile di Dalacin T sulle zone interessate.

Agitare Dalacin T emulsione ogni volta prima dell'uso. Dalacin T emulsione si applica direttamente.

L'uso e la sicurezza di Dalacin T nei bambini e negli adolescenti finora non sono stati esaminati.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali può avere Dalacin T?



Con l'uso di Dalacin T possono insorgere i seguenti effetti collaterali:

Molto comune (riguarda più di 1 persona su 10)

Irritazioni cutanee (con sensazione di bruciore, prurito, esfoliazione), cute secca e orticaria.

Comune (riguarda da 1 a 10 persone su 100)

Disturbi gastrointestinali come nausea e diarrea così come pelle grassa/oleosa (cosiddetta seborrea).

Sono stati inoltre osservati dolori alla pancia, dolori agli occhi, eruzioni cutanee (dermatiti da contatto) e infiammazioni dei follicoli piliferi.

Se nel corso del trattamento con Dalacin T manifesta una forte diarrea, interrompa il medicamento e consulti immediatamente il medico curante.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o farmacista soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Dalacin T?

Principi attivi

1 g di emulsione contiene 10 mg di clindamicina sotto forma di clindamicina fosfato.

Sostanze ausiliarie

Glicerina, sodio lauroil sarcosinato, acido stearico, gliceril stearato, alcol cetostearilico, alcol isostearilico, acqua, metilidrossi benzoato (E 218).

Numero dell'omologazione

48006 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Dalacin T? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica.

Dalacin T emulsione cutanea: flaconi da 60 ml.

Titolare dell'omologazione

Pfizer AG, Zürich.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2022 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

PIL V015

