

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Doxiproct®

OM Pharma SA

Qu'est-ce que Doxiproct et quand doit-il être utilisé?

Doxiproct pommade rectale contient comme principes actifs: le dobésilate de calcium qui agit sur les petits vaisseaux sanguins, les capillaires, en normalisant la résistance et la perméabilité de leur paroi, la lidocaïne, un analgésique local qui calme la douleur.

Doxiproct diminue l'inflammation, les saignements, les suintements et amène un soulagement rapide des douleurs, brûlures, démangeaisons, sensations de tension dans les affections suivantes: hémorroïdes internes et externes, prurit (démangeaisons) anal, inflammation dans la région anale. Doxiproct peut être utilisé, sur conseil d'un médecin ou d'un pharmacien, dans les cas de fissures anales, avant et après une opération des hémorroïdes.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si vous souffrez d'hémorroïdes, vous devriez:

- réduire la consommation des épices et des condiments, de la charcuterie, de l'alcool, ainsi que de thé et de café,
- prévenir la constipation, par exemple en suivant un régime riche en fibres (pain complet, légumes verts cuits et crus, fruits),
- veiller à éviter un surplus de poids,
- veiller à une hygiène stricte de la région anale tout en limitant l'usage du savon.

Quand Doxiproct ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants, vous ne devez pas utiliser Doxiproct.

Doxiproct ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 14 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Doxiproct?

En général vous ne devriez pas utiliser Doxiproct pendant des périodes prolongées sans avis de votre médecin.

Vous devez informer un médecin si après 1 à 2 semaines de traitement les troubles ne se sont pas améliorés ou s'ils se sont aggravés. Les traitements répétés ne doivent être entrepris qu'après un diagnostic médical sûr. Chaque traitement ne devrait pas durer plus de 2 semaines.

En cas d'apparition de réactions cutanées et/ou de fièvre, le traitement devrait être arrêté immédiatement et le médecin informé, étant donné qu'il peut s'agir de réactions allergiques. En cas de perte ou de suspicion de sang dans les selles ainsi que lors d'apparition simultanée de douleurs et de fièvre, consultez un médecin.

Lorsque vous souffrez d'un mauvais fonctionnement de vos reins, vous ne devez utiliser Doxiproct que quelques jours.

Doxiproct contient du butylhydroxyanisole (E 320), de l'alcool cétylique et du propylène glycol (310 mg/g) pouvant provoquer des réactions cutanées locales (dermatite de contact) ou des irritations des yeux et des muqueuses. En cas d'apparition de l'un de ces symptômes, le traitement devrait être arrêté et le médecin



informé.

Veillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication !).

Doxiproct peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Si vous êtes enceinte, si vous souhaitez le devenir ou si vous allaitez, vous devriez, par précaution, renoncer à prendre des médicaments ou alors demander l'avis de votre médecin. En ce qui concerne Doxiproct, le risque encouru par l'enfant à naître ou par le nourrisson allaité n'étant pas connu à ce jour, vous ne devriez utiliser ce produit qu'après en avoir discuté avec votre médecin.

Comment utiliser Doxiproct?

En règle générale, appliquer la pommade rectale, si possible après avoir été à la selle.

En cas d'hémorroïdes internes, utiliser la canule en la vissant à l'extrémité du tube. Insérer la canule le plus profondément possible dans l'anus et presser le tube doucement tout en le retirant. Dans ce cas, le tube de pommade rectale est prévu pour 10 applications. Au début du traitement, il peut être préférable de mettre la crème à l'aide des doigts.

En cas d'hémorroïdes externes ou de prurit anal, appliquer une fine couche de pommade rectale plusieurs fois par jour.

Le traitement avec Doxiproct ne doit pas durer plus de 2 semaines après la première apparition des douleurs. Consultez un médecin le cas échéant. Une répétition du traitement ne doit être entreprise qu'après un diagnostic médical sûr. Lorsque vous souffrez d'un mauvais fonctionnement de vos reins, la durée du traitement doit être limitée à quelques jours.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Doxiproct peut-il provoquer?

L'utilisation de Doxiproct peut provoquer les effets secondaires suivants:

Très rare (concerne moins d'un utilisateur sur 10 000): réactions d'hypersensibilité, troubles gastro-intestinaux, inconfort dans la zone anale, anus douloureux.

En cas d'apparition de réactions cutanées et/ou de fièvre, le traitement devrait être arrêté immédiatement et le médecin informé, étant donné qu'il peut s'agir de réactions allergiques.

Si vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice d'emballage.

A quoi faut-il encore faire attention?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Les médicaments périmés ou qui ne sont plus utilisés dans les ménages peuvent être rapportés dans les pharmacies ou dans les centres de collecte. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15–25 °C).

Tenir hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.



Que contient Doxiproct?

1 g de pommade rectale contient:

Principes actifs: 40 mg de dobésilate de calcium monohydraté, 20 mg de chlorhydrate de lidocaïne monohydraté.

Excipients: macrogol 300, macrogol 1500, macrogol 4000, propylèneglycol, butylhydroxyanisole (E320), gallate de propyle (E310), polysorbate 80, acide citrique (E330), alcool cétylique.

Numéro d'autorisation

38932 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Doxiproct? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Tube de 30 g de pommade rectale avec canule d'application.

Titulaire de l'autorisation

OM Pharma SA

1217 Meyrin

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juillet 2020 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

