

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Lubexyl®

Permamed AG

Che cos'è Lubexyl e quando si usa?

Lubexyl è una sospensione cutanea con il principio attivo perossido di benzoile.

Lubexyl pulisce la pelle e favorisce il processo di guarigione nella cura dell'acne.

Per il trattamento dell'acne Lubexyl agisce a tre livelli diversi:

- effetto antimicrobico: inibisce la crescita dei batteri responsabili dell'insorgenza dell'acne,
- effetto antiseborroico: riduce la produzione di sebo, aumentata nell'acne,
- effetto cheratolitico/comedolitico: apre le ghiandole sebacee, cheratinizzate e quindi ostruite, e impedisce la formazione di pustole.

Usando regolarmente il farmaco, si eliminano le manifestazioni dell'acne (brufoli, pustole, comedoni) e se ne combatte la ricomparsa.

Quando non si può usare Lubexyl?

Lubexyl non si può usare in caso di intolleranza al principio attivo perossido di benzoile o a una delle sostanze ausiliarie.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Lubexyl?

Il preparato non deve venire a contatto con gli occhi, le palpebre, le labbra o le mucose. In caso di contatto accidentale, risciacquare con acqua abbondante la zona interessata. Deve essere usato con prudenza nella zona della bocca e del naso.

Nei pazienti che in passato hanno avuto malattie allergiche della pelle (p.es. eczema atopico) occorre prudenza nell'uso del perossido di benzoile, soprattutto in caso di pelle secca e di diminuita produzione di sebo.

Si sconsiglia l'uso concomitante di prodotti che irritano la pelle o la disidratano (p.es. altri preparati contro l'acne, prodotti contenenti alcool, saponi e cosmetici che provocano forte disidratazione) e l'irradiazione UV intensa (bagno di sole, solarium), perché ciò potrebbe causare forti irritazioni cutanee.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente

Si può usare Lubexyl durante la gravidanza o l'allattamento?

Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile a usare medicinali durante la gravidanza e l'allattamento. Se è incinta, prevede una gravidanza oppure allatta, può usare Lubexyl esclusivamente dopo aver consultato il medico.

Come usare Lubexyl?

Adulti e adolescenti sopra i 12 anni:



Lubexyl si usa come un sapone liquido. Umettare leggermente la pelle con acqua tiepida, poi applicare con le mani pulite qualche spruzzo di Lubexyl sulle zone cutanee interessate, distribuire bene e dopo 1–2 minuti sciacquare a fondo con acqua.

Salvo diversa prescrizione, il medicamento si usa due volte al giorno. Il medico può però adeguare la frequenza delle applicazioni e il tempo di posa alla sensibilità della pelle del paziente e alla gravità dell'acne.

Bambini sotto i 12 anni:

Non sono disponibili dati clinici sull'efficacia e sulla sicurezza in questa fascia d'età.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Lubexyl?

In seguito all'applicazione del Lubexyl possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Nei primi giorni, l'inizio dell'effetto del Lubexyl può essere accompagnato da sensazione di tensione e leggero arrossamento della pelle. Il leggero bruciore iniziale che può essere notato in caso di pelle sensibile scompare normalmente nel corso del trattamento. Se l'eccessivo arrossamento e il bruciore persistono per più di 5 giorni, bisogna interrompere l'uso del medicamento e consultare il medico. Scomparsi i fenomeni di irritazione, si può spesso proseguire il trattamento con applicazioni meno frequenti o minor durata d'azione.

In casi rari possono manifestarsi delle reazioni allergiche.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti, dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Quando applica e sciacqua Lubexyl, stia attento a evitare il contatto con gli occhi e le mucose (labbra, bocca e narici). In caso di contatto accidentale, sciacquare con abbondante acqua.

A causa del suo effetto schiarente, Lubexyl non deve venire a contatto con peli e capelli (sopracciglia, barba, attaccatura dei capelli) e con tessuti colorati, perché potrebbe schiarirli o stingerli.

Stabilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Istruzioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Lubexyl?

Principi attivi

1 g di sospensione contiene 40 mg di perossido di benzoile.

Sostanze ausiliarie

Macrogol-3-stearato, lauriletere solfato di sodio, carbomer 980, idrossido di sodio, sodio edetato, acqua purificata.

Numero dell'omologazione

49416 (Swissmedic).



Dove è ottenibile Lubexyl? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, *senza* prescrizione medica.

Flaconi da 150 ml.

Titolare dell'omologazione

Permamed AG, CH-4143 Dornach.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

