

## **Information für Patientinnen und Patienten**

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen. Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden und Sie dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnte das Arzneimittel ihnen schaden. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

## **Larifikehl® D5, Tropfen**

Homöopathisches Arzneimittel

### **Wann wird Larifikehl® D5, Tropfen angewendet?**

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild kann Larifikehl® D5, Tropfen auf Verschreibung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin bei Fieber, bei Lungenkrankheiten und bei Entzündungen der Verdauungsorgane angewendet werden.

### **Was sollte dazu beachtet werden?**

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Larifikehl® D5, Tropfen gleichzeitig eingenommen werden darf.

### **Wann darf Larifikehl® D5, Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?**

Zur Anwendung von Larifikehl D5, Tropfen bei Kindern und Jugendlichen liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Die Anwendung bei Kinder und Jugendlichen wird daher nicht empfohlen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äußerlich anwenden.

### **Darf Larifikehl® D5, Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?**

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

### **Wie verwenden Sie Larifikehl® D5, Tropfen?**

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben, für Erwachsene:

1 mal täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit einnehmen. Bei gleichzeitiger Injektionsbehandlung an den injektionsfreien Tagen 2 x wöchentlich 5-10 Tropfen.

Die Anwendung und Sicherheit von Larifikehl® D5, Tropfen bei Kindern und Jugendlichen wurde bisher nicht geprüft.



Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

### **Welche Nebenwirkungen kann Larifikehl® D5, Tropfen haben?**

Für Larifikehl® D5, Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Larifikehl® D5, Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

### **Was ist ferner zu beachten?**

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit „verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Raumtemperatur (15-25 °C) aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin.

### **Was ist in Larifikehl® D5, Tropfen enthalten?**

Laricifomes officinalis D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

### **Zulassungsnummer**

51531 (Swissmedic)

### **Wo erhalten Sie Larifikehl® D5, Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?**

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Packung zu 10 mL.

### **ZulassungsinhaberIn**

ebi-pharm ag, Lindachstr. 8c, 3038 Kirchlindach

**Diese Packungsbeilage wurde im November 2005 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.**

