

Information destinée aux patients

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant ce médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance médicale par votre pharmacien ou votre droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien ou de votre droguiste. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

SIMILASAN Troubles de dentition, globules

Médicament homéopathique

Quand SIMILASAN Troubles de dentition est-il utilisé ?

Selon la conception homéopathique, *SIMILASAN Troubles de dentition* peut être utilisé en cas de Éruption difficile ou trop tardive des dents; Troubles de dentition accompagnés de: Salivation intense et d'un besoin aigu de mordiller, Diarrhée; Irritation, nervosité, dentition douloureuse
L'utilisation de ce médicament dans le champ d'applications indiqué est basée exclusivement sur les principes de l'homéopathie.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Si votre médecin a prescrit d'autres médicaments à votre enfant, demandez-lui ou à votre pharmacien / pharmacienne si *SIMILASAN Troubles de dentition* peut être utilisé simultanément.

Quand SIMILASAN Troubles de dentition ne doit-il pas être pris ou seulement avec précaution ?

En raison de la forme galénique des globules, ce médicament ne doit être utilisé qu'après consultation médicale pour les enfants âgés de moins d'un an.

En raison de l'indication homologuée, *SIMILASAN Troubles de dentition* est prévu pour les enfants en bas âge et les enfants jusqu'à 6 ans.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste si votre enfant

- vous souffrez d'une autre maladie
- vous êtes allergique
- vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

SIMILASAN Troubles de dentition peut-il être pris pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Non applicable.

Comment utiliser SIMILASAN Troubles de dentition?

Sauf prescription contraire du médecin:

- **Enfants en bas âge et enfants jusqu'à 6 ans au début de la dentition:**
3 x par jour 7 globules (granules).
- **Enfants en bas âge et enfants jusqu'à 6 ans en cas de troubles aigus de la dentition:**
7 globules (granules) tous les quarts d'heure, jusqu'à disparition complète des troubles; jusqu'à 70 globules par jour au maximum.



En raison de l'indication homologuée, *SIMILASAN Troubles de dentition* est prévu pour les enfants en bas âge et les enfants jusqu'à 6 ans.

Mode d'emploi:

- Laisser fondre les globules dans la bouche.
- Les globules peuvent être pris même si vous êtes à jeun.

Le temps d'action d'un médicament peut varier d'une personne à l'autre. C'est pourquoi il est conseillé d'administrer une nouvelle prise lorsque l'effet de la préparation diminue ou les troubles reviennent. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. En l'absence de l'amélioration escomptée lors d'un traitement chez le petit enfant / l'enfant, veuillez consulter un médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires *SIMILASAN Troubles de dentition* peut-il provoquer ?

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec *SIMILASAN Troubles de dentition* et informez-en votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Aucun effet secondaire de *SIMILASAN Troubles de dentition* n'a été constaté à ce jour en cas d'usage conforme à celui auquel le médicament est destiné. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention <EXP> sur le récipient.

Remarques concernant le stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Remarques complémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient *SIMILASAN Troubles de dentition* peut-il provoquer?

1 g de globules contient:

Principes actifs

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D12 1.666 mg Calcium fluoratum (HAB) D12 1.666 mg / Calcium phosphoricum (HAB) D12 1.666 mg / Chamomilla recutita (HAB) D8 1.666 mg/ Ferrum phosphoricum (HAB) D12 1.66 mg/ Podophyllum peltatum (HAB) D12 1.66 mg

Excipients

xylite (E 967) 600 mg, carbonate de calcium

1 g correspond à 70-90 globules



Numéro d'autorisation

47659 (Swissmedic)

Où obtenez-vous *SIMILASAN Troubles de dentition* peut-il provoquer ? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Conditionnements: 15 g

4,5 g (seulement si fait partie de la pharmacie de poche)

Titulaire de l'autorisation

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2021 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

