

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico o del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione, globuli

Medicamento omeopatico

Quando si usa *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione*?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione* può essere usato in caso di Dentizione difficile e ritardata; Disturbi della dentizione accompagnati da: Forte secrezione salivare e bisogno di mordere, Diarrea; Irritazione, agitazione, dolori dovuti alle dentizione.

L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa esclusivamente sui principi di un indirizzo terapeutico omeopatico.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il medico ha prescritto a suo/a figlio/a altri medicinali, consulti il medico o il farmacista per sapere se *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione* possa essere assunto in concomitanza.

Quando non si può assumere *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione* e quando la sua somministrazione/il suo uso richiede prudenza?

Essendo disponibile nella forma farmaceutica in globuli, nei bambini piccoli sotto 1 anno di vita il medicamento deve essere utilizzato solo previo consulto medico.

L'indicazione omologata di *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione* ne prevede l'uso in bambini piccoli e in bambini fino a 6 anni.

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui suo/a figlio/a

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa)

Si può assumere *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione* durante la gravidanza o l'allattamento?

Non pertinente.

Come usare *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione*?

Salvo diversamente prescritto dal medico:

– *Bambini piccoli e bambini fino a 6 anni con principio di dentizione:*

7 globuli (granuli) 3 volte al giorno.

– *Bambini piccoli e bambini fino a 6 anni in caso di disturbi acuti della dentizione:*

7 globuli (granuli) ogni quarto d'ora fino alla completa scomparsa dei disturbi, per un massimo di 70 globuli al giorno. .



L'indicazione omologata di *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione* ne prevede l'uso in bambini piccoli e in bambini fino a 6 anni.

Avvertenze per l'assunzione:

- Lasciar sciogliere i globuli in bocca.
- L'assunzione può avvenire anche a stomaco vuoto.

La durata dell'effetto varia a seconda del soggetto. In generale si consiglia di ripetere la somministrazione del preparato in caso di riduzione dell'effetto o di ripresa dei sintomi.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se il trattamento di un bambino piccolo/di un bambino, non produce il miglioramento auspicato, consulti un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione*?

Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione* e informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione*. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione*?

1 g di globuli contiene:

Principi attivi

Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D12 1.666 mg Calcium fluoratum (HAB) D12 1.666 mg / Calcium phosphoricum (HAB) D12 1.666 mg / Chamomilla recutita (HAB) D8 1.666 mg/ Ferrum phosphoricum (HAB) D12 1.66 mg/ Podophyllum peltatum (HAB) D12 1.66 mg

Sostanze ausiliarie

xilitolo (E 967) 600 mg; carbonato di calcio

1 g equivale a 70-90 globuli



Numero dell'omologazione

47659 (Swissmedic)

Dove è ottenibile *SIMILASAN Disturbi dovuti alla dentizione*? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni: 15 g

4,5 g (solo come parte integrante della farmacia tascabile)

Titolare dell'omologazione

Similasan AG, CH-8916 Jonen

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nell'ottobre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

