

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Pevaryl® crema / polvere cutanea / spray cutaneo, soluzione

Medius AG

Che cos'è Pevaryl e quando si usa?

Pevaryl è un medicamento destinato a eliminare in modo affidabile i funghi che infestano la pelle, quali il piede d'atleta, le micosi della regione inguinale, degli organi genitali esterni, del corpo e della regione del capo. Il prurito che spesso accompagna le dermatomicosi, scompare generalmente in pochi giorni.

Quando non si può usare Pevaryl?

Pevaryl non deve essere ingerito né applicato nell'occhio/intorno all'occhio.

Non utilizzare Pevaryl in caso di ipersensibilità nota verso l'econazolo o una delle sostanze ausiliarie secondo la composizione e in caso di ipersensibilità verso altri antimicotici della stessa classe di principio attivo (derivati dell'imidazolo).

Pevaryl spray cutaneo, soluzione: non spruzzare sulle mucose.

Pevaryl polvere cutanea contiene talco. Non inalare la polvere per evitare di irritare le vie respiratorie. Ciò vale in particolare per i bambini.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Pevaryl?

Se durante il trattamento con Pevaryl i disturbi non migliorano o addirittura peggiorano, consulti il suo medico.

Sostanze ausiliarie

Pevaryl crema contiene 10 mg di acido benzoico per 5 g di crema, equivalenti a 2.0 mg/1 g. Può causare irritazioni locali.

Pevaryl crema contiene idrossianisolo butilato (E 320), che può causare reazioni cutanee localizzate (ad es. dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Pevaryl spray cutaneo, soluzione contiene propilene glicole, che può causare irritazioni cutanee.

Pevaryl spray cutaneo, soluzione contiene 495.0 mg di etanolo per g di soluzione. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Pevaryl polvere cutanea e Pevaryl spray cutaneo, soluzione contengono un aroma a sua volta contenente allergeni. Gli allergeni possono causare reazioni allergiche. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Pevaryl durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante la gravidanza o l'allattamento non si può applicare Pevaryl, a meno che il medico non lo prescriva. Per prudenza, rinunci nella misura del possibile ad usare medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedi consiglio al suo medico, farmacista o droghiere.

Come usare Pevaryl?

Crema

Adulti e bambini dai 2 anni in su: salvo diversa prescrizione medica, Pevaryl crema si applica 1-2 volte al giorno sulle aree cutanee colpite, massaggiando leggermente con le dita per farlo penetrare.



La durata del trattamento è di 2-4 settimane. In casi particolarmente ostinati, il trattamento può durare più a lungo. Per ottenere la guarigione completa è essenziale un'applicazione regolare di Pevaryl.

Per evitare ricadute, si deve continuare il trattamento ancora per una settimana dopo la guarigione.

Bambini al disotto dei 2 anni: per i bambini di età inferiore ai 2 anni: applicare Pevaryl crema secondo prescrizione medica.

Polvere cutanea

Adulti: Pevaryl polvere cutanea si applica 1-2 volte al giorno sulle aree cutanee colpite, massaggiando leggermente con le dita per farlo penetrare.

Spray cutaneo, soluzione

Adulti: 1-2 volte al giorno, nebulizzare lo spray sulle aree cutanee malate da una distanza di circa 20 cm. Per l'uso, premere più volte energicamente sull'erogatore.

Bambini: la sicurezza e l'efficacia di Pevaryl polvere cutanea e di Pevaryl spray cutaneo, soluzione nei bambini non sono state esaminate.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Pevaryl?

Se si utilizza Pevaryl, possono presentarsi i seguenti effetti collaterali:

In casi rari, sussiste un'ipersensibilità verso antimicotici del tipo imidazolo o verso un altro componente del preparato. Comunemente possono manifestarsi bruciore, prurito o dolori nel punto di applicazione.

Molto raramente a seguito del trattamento con Pevaryl sono state osservate le seguenti reazioni cutanee: edemi vascolari, dermatite da contatto, eruzioni cutanee, orticaria, formazione di vescicole e desquamazione. In questo caso deve consultare il medico e sospendere il trattamento con Pevaryl.

Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Pevaryl crema, Pevaryl spray cutaneo, soluzione: conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Pevaryl polvere cutanea: non conservare al di sopra di 30 °C.

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Per motivi di razionalizzazione, vengono usati tubetti standardizzati. Per questa ragione, sono inevitabili piccoli spazi vuoti a seconda del volume del contenuto, sebbene il peso del contenuto corrisponda alle prescrizioni.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Cosa contiene Pevaryl?

Principi attivi

Crema: 1 g contiene 10 mg di econazolo nitrato

Polvere cutanea: 1 g contiene 10 mg di econazolo nitrato

Spray cutaneo, soluzione: 1 g contiene 10 mg di econazolo nitrato



Sostanze ausiliarie

Crema: acido benzoico (E 210), idrossianisolo butilato (E 320), paraffina liquida, macrogol-6-stearato (e) macrogol-32-stearato (e) glicole etilenico stearato, macrogolgliceridi oleici, acqua depurata.

Polvere cutanea: talco, ossido di zinco, silice colloidale anidra, profumo (con alcol benzilico, alcol cinnamilico, citrale, eugenolo, idrossicitronellale, isoeugenolo, benzil salicilato, aldeide cinnamica, cumarina, geraniolo, farnesolo, linalolo, benzile benzoato, citronellolo, esilcinnamale, limonene, alfa-isometilione).

Spray cutaneo, soluzione: etanolo anidro, glicole propilenico, trometamolo, profumo (con alcol benzilico, alcol cinnamilico, citrale, eugenolo, idrossicitronellale, isoeugenolo, benzil salicilato, aldeide cinnamica, cumarina, geraniolo, farnesolo, linalolo, benzile benzoato, citronellolo, esilcinnamale, limonene, alfa-isometilione).

Numero dell'omologazione

38334, 38335, 50639 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Pevaryl? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Crema da 30 g.

Polvere cutanea da 30 g.

Spray cutaneo, soluzione da 30 g.

Titolare dell'omologazione

Medius AG, 4132 Muttenz.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel settembre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

